

제탈정

일반의약품 조제용
분류번호: 233

GENTAL Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제 2000I (KP)	5mg
[이 약 1g의 건조물을 가지고 정량할 때 전분당화력 (pH 5.0) 15,000~20,000단위, 전분호정화력 (pH 5.0) 30,000~42,000단위, 단백소화력 (pH 3.0) 9,500~17,000단위, 단백질소화력 (pH 6.0) 22,000~40,000단위, 단백소화력 (pH 8.0) 17,000~34,000단위, 섬유소당화력 (pH 4.5) 120~300단위]	
리파제 II (KP)	5mg
[1g 중 지방소화력 (pH 6.0) 6,000~7,500단위]	
우르소데옥시콜산 (KP)	10mg
첨가제 (타르색소) : 황색4호, 청색1호, 황색4호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크	
첨가제 (동물유래) : 유당수화물 (소의 원유에서 유래)	

【성 상】 녹색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 소화불량에 의한 위부·복부팽만감, 과식, 위체, 가슴이 답답함, 식욕부진(식욕감퇴)

【용법·용량】 성인 (15세 이상)은 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 복용에 있어 다음 사항에 주의한다.

이 약의 정해진 용법, 용량을 엄수한다.

4. 복용 중 또는 복용 후에 다음 사항에 주의한다.

- 1) 이 약의 복용에 의해 연변(붉은 변), 하리를 발생하는 경우가 있다.
- 2) 2주간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우는 일시 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상의한다.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피해 가능한 습기가 적고 시원한 장소에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 용기 내의 충전물은 수송 중의 정제 파손 방지용이므로 개봉 후에는 버린다.
- 4) 오용[잘못 사용]을 피하고 품질을 유지하기 위해 타용기에 넣지 않는다.
- 5) 사용기한을 넘은 경우에는 사용하지 않는다.

【포장단위】 500정/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 첨부문서를 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

개정년월일 : 2017. 08. 25

※ 본 의약품은 우수 의약품 제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부 [Tel:02-580-5900(대)]로 문의하여 주시기 바랍니다. 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되며, 의약품용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.