

※ 사용 전에 첨부 문서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품
분류번호 : 231
KGMP 적격업체

이튼튼 캡슐

원료약품 및 그 분량 (1캡슐 중)

리소짐염산염(KPC)	30.0mg(역가)
직타용아스코르브산97%(별규) (아스코르브산으로서 150mg)	154.64mg
토코페롤아세테이트2배산(KPC) (토코페롤아세테이트로서 5.0 I.U.)	10.0mg
카르바조크롬(KPC)	2.0mg
옥수수전분(KP)	102.36mg
카르복시메틸셀룰로오스칼슘(KP)	9.0mg
스테아르산마그네슘(KP)	6.0mg
첨가제(동물유래) : 리소짐염산염(닭·난백)	
첨가제(타르색소) : 적색 3호, 청색 1호	

성상

연한 분홍색 가루가 든 상. 하부 청색의 경질캡슐재

효능·효과

치은염(잇몸염), 치조(이름)농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증)의 완화

용법·용량

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2. 부작용

- 1) 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.
- 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴종)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은 반점), 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상상의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

제조업체

정우신약(주) - 충청남도 아산시 신창면 서부남로 790번길 60

제조자

알리코제약(주) - 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21

판매자

(주)대웅생명과학 - 서울시 강동구 강동대로 189

저장방법 및 사용기간

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위

10캡슐, 120캡슐, 240캡슐

취급상의 주의사항

※본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※개정일자(2013년 09월 25일) 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.
※약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하여야 합니다.
※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
※본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.



개정일자 : 2013년09월25일