

[용량 및 용법] 1. 성인 및 2세 이상의 유·소아 1회용, 요충, 심이에서
장충, 편충, 아메리카 구충: 400 mg을 1회 복용한다. 2세 이상의 유·소아의 요충증은, 200 mg을 1회 복용하고 7일 후 200 mg을
반복 복용할 수 있다. 2) 분선충: 1일 1회 400 mg을 3일간 복용한다.
3) 편충의 중증심한 증상환자 감염시: 1일 1회 400 mg을 3일간 복용한다.

※ 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제
(설사약)를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요없습니다.
※ 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차
복용을 실시할 수 있습니다.

603-CS-50117

[사용상 주의사항]

1. 경도 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서
분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할
필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여를 제한할 것
※ 1일 허용량제한 아스파탐 함유량 WHO 권장량 40mg/kg/일이하로
조정가능한 최소량 사용량 및 60kg 성인: 1일 최대복용량 24g

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 약 및 이 약 구성 성분에
과민반응 환자 2) 임부 3) 2세 미만의 영아 4) 이 약은 유당을 함유하고
있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소
결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애
(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는
환자에게는 투여하면 안 된다. 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 이 약은
황산화소색소로 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이
성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4. 이
약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 테오필린: 테오필린의
대사를 억제할 수 있다. 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 및
약사와 상담할 것 이 약이 모유로 이행되기에 관해서는 알려져 있지
않으나, 이 약 복용 시에는 수유를 중단하는 것이 좋다. 6. 다음과 같은 경우 이 약의
복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상담할 것 상당 시 가능한 이 첨부분사를
소지할 것 1) 파부정맥염증후군(스티븐스-존슨증후군, 다형홍반)에러도양의
붉은 반점이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다. 2) 구역,

구토, 속쓰림, 설사, 상복부 또는 복부(배부위) 통증 등의 위장관 장애 또는 두통
및 어지러움이 나타날 수 있다. 3) 드물게 발열, 발진, 전신 발적증현되어
불어짐, 가려움, 두드러기 등이 나타나는 보고가 있다. 4. 가역적인(회복가능한) 혈도증이 나타날 수 있다. 7. 기타 이 약의 복용 시 주의할
사항 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것
임신초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 가임연령의 여성은 생리 첫 주
동안 또는 임신 테스트에서 음성인 나타난 후에 치료를 시작할 것 2)
임상검사치에의 영향: 때때로 가역적인(회복가능한) 백혈구 수의 감소를 유발
할 수 있고 과도한 처방시 병혈과 간지혈과 간소증 및 간효소치 이상을 유발 할
수 있다. 3) 프라자퀼이 알벤다졸 활성대사체의 활성능도를 증가시킨다는
보고가 있다. 4) 과량투여했을 경우 대증요법(위세척 및 알칼리인 지지 요법을
사용한다. 8. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2)
직사광선의 파하여 건조한 곳에 실온 보관할 것 3) 오·남용을 피하고, 품질을
보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

[제조자의지] 익수제약(주) 경기도 광주시 곤지암읍 독고개길86번길 38

[제조자] (주)한국파비스제약 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

본 약품은 GMP작업장에서 제조하여 양한 품질을 보장합니다. 구입시 사용기한이
경과 되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우 교환을 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품은 공장(대우원회) 고시 색차 분해기준에 의거 보상을 받을 수 있습니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

알벤다졸(USP) 400 mg
첨가제(타르색소): 황색 5호
첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

[효능 및 효과] 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충,

분선충의 감염 및 이들 혼합 감염의 치료

[성 상] 연한 주황색의 장방형 필름코팅제

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 2015년 11월 17일 이후 변경된 내용은 온라인의약도서관

(http://drug.mds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.



(010)8806585011079

KGMP

유수의약품 직거래처

일반의약품 642

사계절 복용하는 종합 구충제

익수 알벤다졸

알벤다졸

정

2정

1 회요법
구충제



KSU 익수제약주식회사

경기도 광주시 곤지암읍 독고개길86번길 38

02-416-1116~7 www.ksu.co.kr