

“속 편하리 복합소화제

원탈정

위장관 기능조절 / 소화효소 / 제산제

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 메타규산알루미늄산마그네슘(KP) 40.0mg
(〔건조물이며〕산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)
탄산수소나트륨(KP) 50.0mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제(별규) 20.0mg
(전분당화력 (pH 4.5) 278 단위, 단백소화력(pH 3.0) 170 단위)
스코폴리아엑스(KP) 5.0mg
(총 알칼로이드히오스아민(C₇H₂₃NO₃: 289.37 및 스코폴라민(C₇H₂₁NO₄: 303.35))로서 50μg)
리파제(KP) 7.5mg
(지방소화력(pH 6.0) 45 단위)
감초가루(생규) 25.0mg
(글리시리진산으로서 0.63mg)
침강탄산칼슘(KP) 100.0mg
트리메부틴말레산염(KP) 50.0mg
- 첨가제(타르색소) : 황색 203호, 황색 4호, 청색 1호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 박하유, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 그린 03B610039, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정제

【효능 · 효과】 위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 식체(위체(제합)), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화 불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

【용법 · 용량】

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토 오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 신장에(신장장애) 환자
- 4) 간장애 환자
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자

6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움증)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 두개(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.
- 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.
- 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

4. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 2) 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

일반의약품

분류번호:232

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본제(이 약)의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기 연용(계속 복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것
- 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔 다리)경련, 마비 등의 이상이 확인 되는 경우에는 복용을 중지할 것

6. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용 (함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것

7. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.

8. 상호작용

위장진통, 진경(경련완화)제와 병용 투여(함께 복용)하지 않는다.

9. 소아 · 임부에 대한 투여

- 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기한】 케이스 연면 참조

【포장단위】 10정/PTP

【제조자】  (주)마더스제약 전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 38

【판매자】 **일양약품(주)** 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견 될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2022.06.15)이후 변경된 내용이나 자세한 품목 허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품 통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2022년 06월 15일

40년 이상 엄마의 마음으로
여러분의 건강을 지켜온



(주)마더스제약 Since 1974 -
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.

WTL10-2206-00