

위·장관 운동기능 조절제 씨트메틴정 (트리메부틴말레산염)



제조번호 :
사용기한 :

일반의약품

10정



씨트메틴정 (트리메부틴말레산염)

위·장관 운동기능 조절제

과민성
대장증후군

기능성
소화불량

구토·경련

씨트메틴정
(트리메부틴말레산염)

위·장관 운동기능
조절제

HL-2501-01

■ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약품을 통하여 교환하여 드립니다. ■ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ■ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오. ■ 기타 자세한 사항이나 문서의 작성(개정)일자(2025.01.16) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다. ■ 의약품 부작용 신고 및 피해 구제 신청 : 한국약물안전관리원(1644-6223, 14-3330)

HLB 에이치엘비제약

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 케이스를 확인하세요.

【유효성분】 1정 중
트리메부틴말레산염(KP) 100mg

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

1. 주효능 효과

- 1) 식도역류 및 열골(구멍, 틱스헤르니아[탈장]), 위 십이지장염, 위 십이지장 궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사)

【용법·용량】

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여 한다.(먹는다, 복용한다) 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 이상반응

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(헛차 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목미움), 구내염(마비강) 등이 나타날 수 있다. →

- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

2. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(상회한다)고 판단되는 경우에만 투여한다.

3. 수유부에 대한 투여

수유 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유 중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여하는 수유를 중지한다.

【포장단위】

10정/상자(10정/피티파×1)

【사용기한】 용기 측면 표시일까지

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

어린이의 손이 닿지 않게 보관하세요.

【첨가제】

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【제조외의자】

에이치엘비제약(주) / 경기도 남양주시 경강로 27

【제조사】

(주)노바엘헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산4로 16-53