

혈액순환 개선제 써큐징코

연질
캡슐

일반 의약품
KGMP적격업체
분류번호 : 219

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(730mg) 중

서양산사60%에탄올엑스(KPC)	50mg
(총 하이페로시드 유도체로서 1mg)	
멜리사엽엑스(KPC)	10g
은행엽엑스(KPC)	5mg
마늘유(KPC)	150mg
(알리신으로서 0.15mg)	

첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색5호

【성 상】 암갈색의 유양물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 혈액순환장애(동맥경화)에 의한 제증상 : 기억력 감퇴, 무기력증, 집중력 약화, 현기증(어지러움), 만성피로

【용법·용량】

성인 1일 3회, 1회 1~2캡슐씩 식전 또는 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약의 주성분으로 사용하는 식물에 과민한 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 24개월

【소비자상담실】 02)521-2308, www.miraepharmkorea.co.kr

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 문안은 (2011년 7월) 작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품정보는 미래제약 홈페이지 또는 (<http://ezdrugkddagok>) (정보미당) (의약품등정보) 에서 확인할 수 있습니다. (개정일 : 2011. 07. 18)

※ 제조의뢰자 : 미래제약주식회사(경기도 안성시 신소현동 137번지) ※ 제조자 : 주식회사동구제약(경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3)