

이모나에프

캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

토코페롤아세테이트50%(KPC)	60mg
클로로필린구리나트륨착염(KPC)	20mg
제피아스코르브산(KPC)	156.25mg
염화리소짐(KPC)	30mg
옥수수전분(KP)	25mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호, 황색203호

동물유래성분 : 유당(젖당)수화물(기원동물:소, 사용부위:우유),

염화리소짐(기원동물:닭, 사용부위:난백)

[성 상] 화녹색 분말이 든 상하 압형색의 경질캡슐

[효능·효과] 치은염(잇몸염), 치조(이들)농루에 의한 여러증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 출혈, 고름 등)의 완화

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
- 2) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용

이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입 안염) 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.

4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
- 3) 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[포장단위] 자사포장단위

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 <주의-부작용>

[소비자상담실] 02)521-2308/ www.miraepharmkorea.co.kr

※본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※이 문안은 (2012년 9월) 작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품정보는 미래제약 홈페이지 또는 (<http://ezdrug.kidago.kr>)-(정보마당)-(의약품등정보)에서 확인할 수 있습니다. 개정일: 2012. 09. 13

제조원 : 미래제약(주) 경기도 안성시 공단2로 104

판매원 : 경보제약(주) 충청남도 아산시 실목로 174