



피부 가려움증 전문치료제 타미락신[®] 연고 (크로타미톤)

몸은 피부 기생에 의한 전염성 피부질환으로 몸 진드기가 사람의 피부 각질층 내에 굴을 만들어 산란할 때 나오는 분비물이 알레르기 반응을 유발하여 환자는 극심한 가려움을 느끼게 됩니다. 이 때 손가락 사이, 손목과 팔꿈치 안쪽, 발가락, 발목, 가슴, 겨드랑이, 남성의 성기 주변에 발진이 나타납니다. 몸은 전염성이 강하므로 환자와의 피부접촉을 피하고, 같이 사는 가족이나 구성원일 경우에는 증상 유무와 관계없이 동시에 치료를 실시해야 합니다. 타미락신연고는 크림 타입의 연고제로 피부에 자극을 주지 않으면서 각종 피부 가려움증에 효과적인 피부 가려움 전문치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

유효성분 : 크로타미톤(USP) 100mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 1mg
파라옥시벤조산프로필(KP) 1mg
기타첨가제 : 글리세릴스테아레이트SE, 세탄올, 소르비탄모노스테아레이트, 수산화나트륨, 스칸케어4263, 스테아릴알코올, 에데트산나트륨수화물, 유동파라핀, 정제수, 카보머940, 폴리소르베이트 80, 폴리옥시에틸렌세틸에테르, 프로필렌글리콜

【성 상】

흰색의 크림형 연고제

【효능 · 효과】

피부가려움

【용법 · 용량】

가볍게 목욕을 한 후 1일 1회 얼굴과 두피를 제외하고 잘 건조된 피부 전체에 바르고 가볍게 마사지한다.
필요시 24시간 후에 반복하여 적용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 급성 루푸스성 피부염 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여 한다.

3. 부작용

- 1) 피부의 자극감 등 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우는 투여를 중지한다.
- 2) 이 약을 바른 직후에 경미한(가벼운) 열감이 나타날 수 있으나 보통 단시간내에 사라진다.
- 3) 열감, 작열감(화끈감), 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 분비물의 증가, 침윤, 접촉성 알레르기 반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

화농(끓음)성 피부염, 습윤(습기 참), 미란(긁무름) 등에는 이를 미리 치료한 후 이 약을 사용한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 이 약 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다(웃돈다)고 판단되는 경우에만 투여하며, 대량 또는 장기간에 걸쳐 광범위하게 사용하지 않는다.
- 2) 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려져 있지 않으나 수유부에 투여시 유방부위에 적용하지 않는다.

6. 소아에 대한 투여

영아(갓난아기) · 유아 및 소아에 투여시 광범위하게 적용하지 않는다.

7. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 대량 또는 장기간에 걸쳐 광범위하게 적용하지 않는다.

8. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 안과용으로 사용하지 않는다.
- 2) 급속에 접촉되면 변질될 수 있으므로 급속주격, 급속용기는 가능한 한 사용하지 않는다. 스테인레스연고 주걱을 사용하여 소분하는 것은 지장이 없다.
- 3) 플라스틱 용기에 소분하여 장기간 보관하는 경우에는 변색 등이 나타날 수 있으므로 가능한 한 빨리 사용한다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 고온을 피하여 보관한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

30g, 50g / 튜브

※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지나거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식물의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 08. 25

제조사
태극제약(주)
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821