

메카바액

(시트룰린말산염)

[원료약품 및 그 분량] 1포(10mL) 중

- 유효성분 : 시트룰린말산염(별규).....1g
- 기타첨가제 : D-소르비톨액, 수산화나트륨, 오렌지에센스, 자일리톨, 정제수

[성상]

오렌지 향이 있는 무색 내지 옅은 황색의 액

[효능·효과]

기능 무력증의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 1g(1포), 1일 3회 물에 희석(물계 함)하여 복용한다.
소아 (6세이상) : 이 약으로서 1회 1g(1포), 1일 2회 물에 희석(물계 함)하여 복용한다.
단, 4주 이상 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
6세 미만의 유아
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 임부 (동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태아 독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
 - 2) 수유부 (유즙(젖) 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.
 - 3) 드물게 투여초기에 약한 위장관(위창자) 장애가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10mL(1포)×42포

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[제조사] 태극제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제ак공단3길 123

☎ 소비자상담전화 080-300-8282

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017년 07월 12일

판매자 : (주)아이월드제약