

근육경련 및 혈액순환개신제

토코네숨

연질
캡슐

【원료약품의 분량】 1캡슐(1365mg)중

토코페롤아세테이트(KP)	500mg
산화디그네숨(KP)	250mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색4호, 청색1호	
동물유래성분(젤라틴) : 건강한 소의 가죽 안쪽 부위에서 유래된 Hide를 사용	

【성상】 회백색의 유상물질이 든 적갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 노년기의 비타민E의 보급
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화
: 어깨, 목걸림, 수족저림, 수족냉증(손발차가움)
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】

12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아(젖먹이)
 - 3) 중증(심한 증상)의 신부전 환자
 - 4) 임부
 - 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
 - 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부, 수유부
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장장애(신장 장애) 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야하는 환자
 - 이상반응
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반, 부전수축, 중추신경계 기능저하
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 유헤르성신부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
 - 상호작용
 - 1) 항일도스타메탄, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여(함께 복용)하지 않는다.
- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
 - 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 습 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 오용(잘못 사용) : 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.
- 【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)보관
- 【소비자상담실】 080-010-1114
- 【사용기간】 제조일로부터 24개월
- 【포장단위】 60캡슐, 120캡슐
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 개정일자이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

작성일자 : 2010. 08

판매원

제조원



kwangdongpharm.com
광동제약주식회사
경기도 평택시 모곡동 440-2



동방에프티엘(주)
경기도 화성시 향남면 상신리904-5