

경남 정120mg



Ginkgosin

일반의약품

분류번호:219

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

● **제품명** : 경남정코신정120mg(은행업엑스)

● **원료약품 및 그 분량** : 1정 중

은행업엑스(생규)(총고고플라본배당체로서 28.8mg) 120mg
첨가제(타르색소): 청색 1호, 황색 203호

● **성상** : 녹색의 원형 필름코팅정

● **효능·효과**

1. 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
2. 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
3. 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애

● **용법·용량**

1. 성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 은행업엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구투여한다(복용한다).
 - 2) 기질성 뇌기능 장애: 은행업엑스로서 1회 40 ~ 80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구투여한다(복용한다).
2. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.



경남제약|주
Kyung Nam Pharm.Co.,Ltd.

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

3. 일반적주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

4. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

● **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● **포장단위** : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● **제 조 자** : 알리코제약(주) 충북 천천군 광혜원면 용소2길 21

● **제조회자** : 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.
3. PTP 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁 해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 「<http://drug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.