

나리돌플러스에이캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분: 아스코브산(KP).....150mg
리소짐염산염(KP).....30mg
토코페롤아세테이트2배산.....10mg
(토코페롤아세테이트로서5mg)
카르바조크롬(KP).....2mg
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(소의 우유), 젤라틴(소, 돼지의 내피)
- 기타첨가제: 옥수수전분, 스테아르산마그네슘, 캡슐, 콜로이드성아산화규소

[성상] 옅은 주황색 분말이 든 상부 황색, 하부 담황색의 경질캡슐제

[효능·효과]

치주치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 15세 미만의 소아
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 환자
- 3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상(예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 4) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약 복용 후 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타난 경우
- 2) 피부 : 피부점막안종후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사사용해(리엘증후군)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안종혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상모양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우.
- 3) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 장기간 계속하여 사용하지 말 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 240캡슐(120캡슐/PTP X 2)

[제품문의처] 080-640-0088

- ※ 본 의약품은 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 변질, 변태 또는 오염이되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 자세한 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품등 제품정보'란을 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.
- ※ 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부 문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

제조사 : **한국코러스(주)**

충북 제천시 강제로 30

제조의뢰자 : **GENUPHARMA (주)제뉴파마**

충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

판매자 : **유한메디카**

충북 청원군 오창읍 연구단지219