

Ferinough F

웨어너프에프 캡슐

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

웨어너프에프캡슐은 전분을 가수분해하여 얻은 저분자 Polysaccharide와 철분을 결합시켜 만든 37가철을 주성분으로 하여 조혈 비타민이라 불리는 폴산과 시아노코발라민이 복합된 제품입니다. 웨어너프에프캡슐은 이온철로 해리되지 않고 착염(Complex)상태로 심이지장과 소장상부까지 도달하여 효소에 의해 분해, 흡수되어 생체이용률이 높고, 빈혈제의 대표적인 부작용인 위장관계 부작용을 감소시킨 제품입니다. 또한 미국 의사들의 처방지침서인 PDR에 수록되어 있는 성분으로 안전성이 검증된 제품으로 임신, 수유기 및 성장기 여성의 철분보급에 효과적인 제품입니다.

[원료약품의 분량] 1캡슐 중
폴리사카리드철착염(철(Fe)로서 150.0mg)(KP) 326.1mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 25.0μg)(KP) 25mg
폴산(KP) 1mg
스테아르산마그네슘(소, 우지), 유당수화물(소, 우유)

[성상] 갈색 분말이 충전된 상·하부 농갈색의 경질캡슐제입니다.

[효능·효과] 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량] 성인 : 1일 1회 1캡슐을 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아[갓난아기]
- 3) 철색소증(철 대사 이상으로 철이 간장, 췌장[이자]에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직 장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철함유량이 증가한 상태) 환자
- 4) 비철결핍성빈혈 (예: 비타민 B12 결핍에 의한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 5) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당[젖당]분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용 테트라사이클린계 제제
- 3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유·유제품은 복용 전·후에는 피하십시오.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성[특정 부분에 나타나는]대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장에[신장장애] 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부, 수유부
- 7) 항알도스테로네제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람 (고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담이 가능한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- 1) 때때로 홍반(붉은 반점), 피부질환, 가려움, 전신권태, 기관지에 의한 호흡곤란 등의 알레르기 증상이 나타나는 경우
- 2) 두드러기, 가려움, 햇빛에 의한 피부 과민반응
- 3) 복부[배부분], 위통증, 위궤양
- 4) 구토, 설사
- 5) 열, 혼수
- 6) 구역, 식욕부진, 체중감소, 부종[부기], 복통[배아픔], 설사, 변비, 흑변, 위부불쾌감
- 7) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 8) 대장투여로 인해 복부[배부분] 통증, 구토, 구역, 설사, 흑변, 토혈[혈액구토], 저혈압, 고나트륨혈증, 혈혈성심부전, 부종[부기], 빈맥[빠른맥], 대사성 산증, 고지혈증, 탈수, 졸음, 창백, 권태, 발작, 속, 혼수

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상이 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
- 3) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 합니다. 빈혈은 혈액 순실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 합니다.
- 4) 이 약에 함유된 폴산은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B12 제제와 병용[함께 복용]하십시오. 다만 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의하십시오.
- 5) 아스코르브산 (비타민 C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 뒤편 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2016년 5월 13일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

※포장 개봉방법 및 유의사항



1. 앞부분을 강하게 눌러 호일로부터 캡슐을 꺼냅니다.
2. 이 제품은 어린이보호용 안전용기 포장으로 개봉이 다소 어렵거나, 개봉시 강한 충격으로 캡슐의 모양이 변형될 수 있습니다.

제조판매자

녹십자
GREEN CROSS

충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL. 031-2600-3300 4층제약사업 TEL. 080-260-0033

설명-10-1517-7