



Strepsils®

스트렙실® 트로키

일반의약품

의약품

231

분류번호

치과구강용약

올바른 약물의 사용을 위하여 복용 전 본 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

인후염은 초기에는 인후부의 아픔, 건조감, 부음, 가벼운 기침 정도의 증세가 나타나다가 심해지면 통증, 삼킴곤란, 고열, 두통, 전신관열, 식욕부진 등의 증상을 호소하게 됩니다. 따라서 초기에 인후부에 발생한 염증을 효과적으로 치료해주는 것이 중요합니다. 스트렙실은 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)인 플루르비프로펜(Flurbiprofen)을 함유한 최초의 트로키제로서 통증의 원인이 되는 염증 부위에 효과적으로 작용하여 빠르고 강력하게 인후염의 염증을 가라앉혀 줍니다. 또한 트로키가 입안에서 다 녹은 후에도 그 효과가 오랫동안 지속됩니다.

제 품 명 스트렙실 허니앤레몬 트로키(플루르비프로펜)**원료약품의 분량**

이 약 1개(2.8g) 중

플루르비프로펜 (FP)

8.75mg

성 상

골과 레몬향이 나는 @가 양면에 음각되어 있는 연한 노란색 또는 황갈색의 원형 트로키

효 능 효 과

인후염의 단기 증상 완화

용 량 용 법

성인 12세 이상 어린이 및 청소년 : 이 약 1개를 입안에서 서서히 녹여서 복용한다. 필요시 3~6시간 간격으로 1일 최대 5개 복용한다. 이 약은 최대 3일간 사용하도록 권장한다. 12세 미만 어린이는 복용하지 않는다. 고령자 : 현재까지 사용경험이 제한적이므로 제시된 권장량은 없다. 이 약은 국소 자극을 피하기 위해 입안에서 골리면서 복용한다.

사용상의 주의사항**▶ 경고**

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다. 2) 삼할관계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 삼할관계 혈전(혈관막) 병증, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가할 수 있다. 삼할관계 질환 또는 삼할관계 질환의 위험 인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있다. 의사와 환자는 이러한 삼할관계 증상의 발현에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 이는 삼할관계 질환의 병력이 없는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 삼할관계 특성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발현되는 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알고 있어야 한다. 3) 위장관계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장궤(장자의) 출혈, 궤양 및 천공(통멍)을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 높을 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가할 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 경양 이상 증상의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 중증(심한증상)의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 한다. 비스테로이드성 소염진통제를 중증(심한증상)의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있다. 구취(구취)의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.

▶ 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약, 아스피린, 다른 비스테로이드성 소염진통제 또는 이 약의 구성성분에 과민성이 있는 환자 2) 소화성궤양, 출혈 또는 그 병력이 있는 환자 3) 아스피린 또는 다른 비스테로이드성 소염진통제에 의한 천식(신장질환 포함), 두드러기, 일례(가) 반응 또는 그 병력이 있는 환자, 기관지경련, 비염의 병력이 있는 환자 4) 중증 신기능부전 환자 5) 비스테로이드성 소염진통제, 항류마티스제에 의한 위장관 출혈 또는 천공(통멍) 발생 병력이 있는 환자 6) 중증(심한증상)의 대장염 환자 7) 중증(심한증상)의 혈액 이상 환자, 불분명한 조혈장애 환자 8) 중증(심한증상)의 간장애, 중증(심한증상)의 신장애 환자 9) 임신 후기 3개월인 임부 10) 유전성 과당 불내증, 포도당-갈락토스 흡수장애, 해당-이소밀라타제 결핍증 환자

▶ 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

1) 이 약은 COX-2 저해제(억제제)를 포함하여 다른 비스테로이드성 소염진통제와 함께 복용 시 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용하지 말아야 한다. 2) 아스피린 등 혈소판 응집 억제제와 병용 시 중증의 위장관계 이상반응의 발생 (예 : 위장관 출혈) 위험을 증가시킬 수 있다. 3) 글루코코르티코이드와 병용 시 위장관 궤양 및 출혈 위험을 증가시킬 수 있다. 4) 칼륨보존이뇨제와 병용 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있다. 5) 신기능 장애 환자에서 안지오텐신전환효소 억제제 또는 안지오텐신 II 길항제(대항제)와 병용 시 급성 신부전증 등 신장기능을 악화시킬 수 있으므로, 이뇨제, 안지오텐신전환효소 억제제, 안지오텐신 II 길항제와 병용 시 주의하여야 한다. 6) 사이클로스포린과 병용 시 신부전증 위험을 증가시킬 수 있다. 7) 메트로트렉세이트 투여 전후 24시간 이내 병용 시 메트로트렉세이트의 농도 및 독성을 증가시킬 수 있다. 비스테로이드성 소염진통제와의 병용투여로 신쇄(관)에서 메트로트렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메트로트렉세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법으로 사용하는 고용량의 메트로트렉세이트와는 병용투여하지 않으며, 저용량의 메트로트렉세이트와 병용할 시 신중히 투여하여야 한다. 8) 이 약과 병용 시 다국산, 페니실린의 합성제가 상승할 수 있다. 9) 동물실험에서 비스테로이드성 소염진통제는 췌장염, 항응고제와 관련된 경련의 위험을 증가시킬 수 있음이 보고되었다. 비스테로이드성 소염진통제와 췌장염, 항응고제 병용 시 경련 발생의 위험이 증가할 수 있다. 10) 이 약은 푸로세미드의 이뇨작용을 감소시킬 수 있다. 11) 위장관계 출혈에 대하여 경구용 항응고제(와파린 등)과 비스테로이드성 소염진통제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다. 12) 비스테로이드성 소염진통제는 항고혈압제의 효과를 감소시킬 수 있다. 13) 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈류의 농도를 증가시키고 리튬의 신장(신장)을 감소시킬 수 있다. 리튬과의 병용에 의해 리튬의 혈중농도를 상승시켜 리튬중독을 일으켰다는 보고가 있다. 14) 비스테로이드성 소염진통제는 미페프리스톤의 효과를 감소시킬 수 있으므로, 미페프리스톤 투여 후 8~12일간 비스테로이드성 소염진통제를 사용해서는 안된다. 15) 프로베나이드 또는 셀레니피롤과 병용 시 비스테로이드성 소염진통제 배설이 지연될 수 있다. 16) 이 약과 다국산, 경구용(약)의 혈당강화제 또는 제산제와의 상호작용을 나타낸 연구는 없었다.

▶ 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

1) 이 약은 모유 중에 매우 낮은 농도로 나타나, 투여 중에는 수유하지 않도록 한다. 2) 비스테로이드성 소염진통제 복용 후 이상반응으로 어지러움 및 시각장애가 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 있다면, 운전하거나 기계적작업을 하지 말아야 한다.

1) 가편지 인식 도는 그 병력이 있는 환자(가편지 경향이 촉진될 수 있다.)와 심기능부전 환자 및 심장, 간 장애 또는 그 병력이 있는 환자(비스트로이더성 소염진통제는 간질환, 신장장애, 신부전을 포함한 다양한 형태의 신장장애를 일으킬 수 있다.)과 과다량의 병력이 있는 환자(이 고혈압 환자(이 약을 포함한 다른 종류의 고혈압성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계에 해악스러운 결과를 초래할 수 있다.)와 이 약의 약효 초기와 투여기간 동안에 혈압을 감지하지 못하며 사망한다.)이 약에 이상 또는 그 병력이 있는 환자, 출혈 경향이 있는 환자(이 약은 출혈시간을 연장할 수 있다. 동맥관질환이 있거나 혈응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부종성인 영향을 받을 수 있는)는 이 약 투여시 신중히 모니터링 해야 한다. 6) 다른 진통제에 알러지각이 있는 환자나 불응하고 있는 환자(가 고령자, 고 말초동맥질환, 뇌혈관질환, 부종성인)가 이 약으로 장기간 치료에 필요한 심혈관질환 위험 요소가 존재하는(예: 고혈압, 고지질증, 당뇨병, 흡연) 환자(이) 고초열(꽃가루 알레르기, 고콜레스테롤 또는 만성 폐쇄성 폐질환)인 임신 중이거나 출산 후 일부(임신 중)에 사용 시 임신, 출산 중 및 출산 후의 영향을 조사할 수 있다. 10) 체액 저류(고혈압 및 신부전)이 있는 환자

상당시 가능한 한 이 침투병을 소치할 것 4장신상경계: 두루, 아자루로, 불면증, 졸림 3장간기계: 사각장애, 미각이상 3 소치기계: 구역, 구토, 변비, 설사, 고창, 소화성 궤양 또는 출혈, 경장성 구내염, 소화불량, 복통, 불면, 위염, 천공궤양성위염, 허혈성궤양기, 궤양인양성궤양 및 화관, 위장염궤양성궤양, 궤양인양성궤양 4 간담도계장기계: 열혈(대증) 드름글, 구내염 구내염, 소화성 궤양, 장적 위장염궤양 병행하는 간염, 간악, 간경변성궤양성궤양은 위장적궤양, 장기 투여시 간 손상 3장간담도계장기계는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 실험 결과 비정상인 환자에 있어서서 투여기간 동안 주의감각 2간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후에: 호산구증가증, 발진과 드르나는 경우에는 이 약의 투여를 중단한다 4 소치기계: 심부전증 등 심장애, 고혈압, 고콜레스테롤 등 장기 투여시 드름글 혈전성궤양성궤양, 혈혈(대증) 심장애, 위염 구내염, 혈관 부종, 빈맥/불맥, 열화 하강 4 열화기: 폐합구구구구, 재생성궤양성궤양, 드름글, 두파구구구구(대우 드름글, 저혈압성궤양 등 드름글, 혈관성궤양 연장 4 뇌졸중기: 기도 폐쇄구구구구 등 동반한 내후후후후후후후 후후후후 4 뇌 손상기: 부종, 급성사신전증, 신중후구, 간질성신장염, 체액지류 9 피부: 발효증, 탈락성피부부, 스티븐스존슨후구, 중증성피부부부(열혈 후후후구)와 같은 급속성 질환, 안면 중증(부기) 10 전신 및 투여후후 후후구기: 발진, 불면증의 일차적인 자극 4 면역계: 발진 및 가려움증 등 동반한 과민성 반응, 전신 발작을 동반한 과민성 반응(경계)에 따라 할당 하강증후, 아나필락시스후후구기 소드 등 중증(신장증상)의 과민성 반응

1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(대상증별로 치료하는 방법임)에 유한다. 2) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.① 급성경련, 동통(痛衝) 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다. ② 환자에게도 통풍한 약물 사용으로 인한 부작용을 피한다. ③ 원인요법에 있은 것으로 생각할 수 있다. 3) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 발생에 유한다. 4) 주로 체온과 관련이 높기, 하지나 다발과 등이 나타날 수 있으므로 특히 고령자 또는 노인환자에 대해서는 더욱 주의하여야 한다. 5) 약의 약리학적 특성에 따른 증상의 다른 증상과 징후를 분별상화(分別相化)로 드러내지 않게하여 통증 및 비만형성 조건하에서 감점 합병증의 진단을 지연시킬 수 있다. 따라서 감염에 의한 염증에 대해 사용할 때에는 적절한 항균제를 병용하고, 전열을 충분히 받아야 신중히 투여한다. 6) 위장성 질환의 위험을 초월할 수 있다. 7) 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에서 이 약을 투여하고자 할 경우에는 시시히 용량을 감소시켜야 한다. 8) 증상을 관리하기 위해 필요한 차단 기간동안 최소 유효량을 투여함으로써 이상반응을 최소화할 수 있다. 9) 과량투여시 구역, 구토, 복통, 위장관 출혈, 두통, 졸음, 혼란, 저혈압, 야뇨증, 무안식, 간 및 신기능장애, 저칼슘, 호흡부전, 황색변이 나타날 수 있다. 유해성을 실시하고, 필요시 혈청 전해질의 보정을 실시해야 한다. 10) 이에 대한 독성학적 데이터가 없다.

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 보관이 바람직함

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Nottingham site, Thane road, Nottingham, Nottinghamshire, NG90 2DB, United Kingdom (Made in UK)

옥시레킷벤키저, 서울특별시 송파구 신천동 7-11 한국광고문화회관 18층, 19층, 대표전화 (02) 421-6789

자사포장단위로 외부포장에 표기되어 있습니다.

200906877

외부포장 참조

밀폐용기, 실온(1~30℃)에서 보관

- * 구입시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 소비자기본법에 따른 소비자분쟁해결기준에 의거 약국 개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환해 드립니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보: 이디드레(ezdrug, ktda.go.kr) 의약품 정보검색
- * 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- * 첨부문서 작성 연월일 (또는 최종 개정 연월일) - 본 의약품의 정보는 2011년 1월에 작성되었으며 이후 변경된 내용은 (www.strepis.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.



**Reckitt
Benckiser**

옥시레킷벤키저
고객상담센터:080-022-9547
<http://www.strepsils.co.kr>

0272958