

유비펜 캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중
비페닐디메틸디카르복실레이트한(별규)125mg
(비페닐디메틸디카르복실레이트로서 12.5밀리그램)
L-프로스테옥시콜산(KP)50mg

[성상]
흰색의 분말이 들어있는 상, 하부 흰색의 경질캡슐제

[효능·효과]
지속적으로 SGPT가 상승되어 있는 만성지속성 간염

[용법·용량]
보통 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 경구 투여한다.

[사용상의 주의 사항]

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.
완전담도 폐쇄가 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 만성 활동성 간염환자
- 2) 간경화 환자
- 3) 저칼륨혈증이 있는 환자
- 4) 심한 췌장 질환이 있는 환자
- 5) 소화성 궤양이 있는 환자
- 6) 담석증 환자

3. 이상반응

- 1) 소화기 : 때때로 설사, 구역, 구토, 드물게 복통, 변비, 가슴앓이, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 때때로 기려움증, 드물게 발진등의 과민증상이 나타날 수 있다. 간혹 파진이 생길 수 있으나 일반적으로 항과민약을 함께 사용하면 소실 된다.
- 3) 일과성 황달이 나타날 수 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
- 4) 기타 : 드물게 전신권태감, 현기가 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 용량을 지킬 것
- 2) 장기간 (최대8주)의 복용에도 불구하고 증상의 개선이 없거나, 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
- 3) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

5. 임신부에 대한 투여

동물 실험에서 태자독성이 보고되어 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 상호작용

경구 당뇨병약(톨부타미드등)과 병용 투여 시 경구 당뇨병약의 작용이 증가 될 수 있으므로 신중히 투여할 것

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위]

자사포장단위

[사용기간]

제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 본 제품은 재정경제부 고시 소비자 피해보상 규정에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이지드럭(ezdrug.kfca.go.kr)사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

수상일자 : 2010년 01월 25일

제조의회 및 판매원

 Bio-technology Corporation
주비티오제약

경기도 여천시 부발읍 가산리 491-7
소비자 상담실 : 080-001-0795

제조사

 Prime

한국프라임제약
전북 원주군 봉동읍 토산리 800 1, 2