

마이크로실드 2액 (클로르헥시딘글루콘산염)

1.5L

■ 원료약품의 분량 : 100mL 중

- 주성분 : 클로르헥시딘글루콘산염(B.P.).....10g
(클로르헥시딘글루콘산염으로서 2g)
- 첨가제 : 타르색소 황색4호, 황색1호

■ 성상 : 향긋한 향을 가진 녹색의 맑은 반 점도성 용액

■ 효능 · 효과 : 보건의료생중사자의 손 소독

■ 용법 · 용량

이 약 5mL를 젖은 손에 덜어 30초간 씻은 후 물로 깨끗이 세척하고, 완전히 말린다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 : 1) 클로르헥시딘제제에 과민증에 병력이 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것 1) 다른 약물에 과민증 환자 2) 천식 등 알레르기 질환 및 그 병력 또는 가족력이 있는 환자 3) 임부 또는 임신 하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부(이 약은 임부에 대한 동물실험이나 임상시험이 전혀 실시되지 않았음)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시, 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것 1) 속 : 드물게 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰 하고, 구역, 불쾌감, 식은땀, 어지러움, 답답함, 호흡곤란, 발적 등의 증상이 나타날 경우에는 즉시 사용을 중지하고, 적절한 처치를 한다. 2) 과민증 : 때때로 발진, 두드러기 등의 과민증상 및 고농도에서 자극감이 나타날 수 있으며, 이러한 경우에는 사용을 중지한다. 3) 광감작이 나타날 수 있다.
4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항 : 1) 속 발현에 대비하여 사용 시 클로르헥시딘제제에 대한 과민증의 병력, 약물 과민체질 여부 등을 충분히 문진해야 한다. 2) 외용으로만 사용하며, 경구투여 및 주사하지 않는다. 실수로 마신 경우 우유, 계란, 젤라틴 등을 이용하여 위세척 등을 하고, 적절한 처치를 한다. 실수로 정맥주사한 경우 용혈반응을 방지 하기 위해 수혈한다. 3) 눈에 접촉 시 각막손상을 일으킬 수 있으므로 눈, 귀에 들어가지 않도록 주의하고, 만약 들어갔을 경우에는 즉시 깨끗한 물을 잘 씻어낸다. 4) 비누류는 이 약의 살균작용을 약화시키므로 충분히 씻어 제거한 후 사용한다. 5) 다른 화학물질이나 세정제를 혼합하지 않는다. 6) 클로르헥시딘글루콘산염 제제로 인해 속을 일으킨 환자 중 몇 명에서 혈청 중 클로르헥시딘에 특이적인 IgE 항체가 검출된 보고가 있다.

MADE IN AUSTRALIA

일반의약품

5. 저장상의 주의사항 : 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 이 약의 활성과 안정성을 위한 적정 pH는 5~6이다. pH가 8이상이면 이 약은 염기가 되어 결정을 형성한다.

■ 포장단위 : 1.5L

■ 저장방법 : 기밀용기, 25℃ 이하 저장

■ 기타

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 의 약품을 구입하였을 때는 구입한 도매상, 병 · 의원을 통해 교환하여 드립니다.

※ 자세한 품목 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약품 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

제조번호 :

사용기한 :



[제조사]

Ensign Laboratories Pty Ltd.

490-500 Wellington Road, Mulgrave VIC 3170, Australia

[제조의회사]

Schulke Australia Pty Ltd.

Suite 3, Level 2/2-4 Lyon Park Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia

[수입판매자]

비엘엔에이치(주)

서울특별시 구로구 가마산로 282 대림오피스밸리 9층
(02-3282-4753)

※개정일자 : 2015년 12월 1일 (MSTL.L 20151201-②)