

• 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
• 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

분류번호 : 319(기타의 비타민제) **일반의약품**

아토믹스®큐플러스 연질캡슐 ATOMIX QPLUS soft capsules

[원료약품의 분량] 1캡슐 중

주성분: 레티놀팔미테이트(KP)	0.736mg(비타민A로서 1250IU)
콜레칼시페롤농축물(유상형)(BP)	0.2mg(비타민D로서 200IU)
토코페롤아세테이트(KP)	50mg(비타민E로서 50IU)
유비데카레논(KP)	5mg
리보플라빈(KP)	6mg
니코틴산아미드(KP)	39.6mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	5mg
아스코르브산(KP)	25mg
폴산(KP)	0.2mg
비오틴(USP)	0.023mg
티아민질산염(KP)	12.5mg
피토나디온5%(별규)	0.6mg
인산수소칼슘수화물(KP)	65mg(인으로서 11.7mg, 칼슘으로서 15.14mg)
푸마르산철(KP)	30mg(철로서 9.86mg)
산화아연(KP)	7.5mg(아연으로서 6.025mg)
산화제이구리(KP)	1.95mg(구리로서 1.52mg)
산화마그네슘(KP)	35mg(마그네슘으로서 21.11mg)
황산망간수화물(USP)	11.55mg(망간으로서 3.75mg)
요오드화칼륨(USP)	0.098mg(요오드로서 0.075mg, 칼륨으로서 0.025mg)
황산칼륨(KP)	5.57mg(칼륨으로서 2.5mg)

[성상]

미향색(연노랑)의 내용물이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐제

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

·비타민A (레티놀팔미테이트)

- 눈의 건조감의 완화, 야맹증 (밤에 잘 못보는 증상)

·비타민D (콜레칼시페롤)

- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

·비타민E (토코페롤아세테이트)

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

·비타민B1 (티아민질산염)

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로

·비타민B2 (리보플라빈)

- 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량]

성인 1일 2회, 1회 1캡슐 식후복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오.(비타민 A결핍증 환자는 제외).
- 2) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 고칼륨혈증 환자
- 5) 윌슨병
- 6) 혈액소중(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 7) 신장(콩팥)결석 환자
- 8) 심한 증상의 신부전 환자
- 9) 콩기름에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

10) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

5. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 하십시오.

② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

③ 임신·수유 중 과량복용시 태아 및 젖먹이의 갑상선기능장애 및 갑상선종을 유발할 수 있습니다.

4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자

5) 심장·순환기계기능 장애 환자

6) 신장(콩팥)장애 환자

7) 저단백혈증 환자

8) 강심배당체를 투여 중인 환자

9) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자

10) 급, 만성 기관지염, 폐부종환자

11) 알칼리증, 소화성궤양 환자

12) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

13) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 저혈압, 열, 굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 두드러기, 광선과민반응, 복부(배 부분)·위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부 통증, 알레르기반응, 혈관부종, 관절통, 호산구증가, 요오드 중독증, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 고칼륨혈증, 가스참, 위장통증, 위장관장애, 소화장애, 폐부종

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

8) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

9) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈엉성증) 위험을 높일 수 있습니다.

10) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

11) 우발적으로 과량복용 한 경우

12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.

3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.

5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 아토믹스큐플러스 연질캡슐..... 60캡슐

[문의전화] 본사 : (02)2021-9300, 소비자상담실 : 080-023-1897 (수신자 요금부담)

[제조회회사] 동화약품(주), 본사: 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장: 충청북도 충주시 충주산단 1로 167

[제조자] (주)알피코프, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조해 주시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 3월 16일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



동화약품

SINCE 1897