

2013년 11월 10일



흡수율이 뛰어난 칼슘제

본에존

(BONE-E-JON)

연질캡슐

일반의약품

분류번호 : 321

KOREA PHARMACEUTICAL INFORMATION CENTER

【성분 · 함량】 (1캡슐 중)

산화미그네슘(미그네슘으로서 60mg)(KPI)	100mg
시트르산칼슘수화물(칼슘으로서 32mg)(USP)	150mg
농축콜라겐시페롤(콜레칼시페롤로서 400 IU)(EP)	0.4mg
청강탄산칼슘(칼슘으로서 160mg)(KPI)	400mg
첨가제(타르색소) : 황색 5호, 청색 1호	

【성 성】

유백색의 유상(기름상태) 내용물을 함유한 녹색의 장방형 연질캡슐

【효능 · 효과】

1. 칼슘결핍(모자람) 및 기타 칼슘의 보급
2. 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
3. 다음 경우의 비타민D의 보급: 수유기, 발육기, 노년기

【용법 · 용량】

12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 2캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- (1) 과칼슘혈증 (Hypercalcaemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정용, 신(콩팥)질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- (3) 12개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난 아기)
- (4) 신(콩팥) 결석 환자
- (5) 중증(중한증상)의 신부전(콩팥기능상장) 환자
- (6) 대우유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (7) 쿨 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피합니다.
- (3) 임부, 수유부
- (4) 심장 · 순환기계 기능 장애 환자
- (5) 신(콩팥)장애 환자
- (6) 저단백혈증 환자
- (7) 감성배당체를 투여 중인 환자
- (8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 부작용

- (1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아름, 심박동불규칙, 피부발진

- 홍반, 설사, 부전수축, 중추신경계 기능저하
- (2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 나트륨성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜니다.
- (2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- (3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호 작용

- (1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께복용)시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- (2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여(함께복용)하지 않습니다.
- 인산염, 칼슘염, 경구용(복용) 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

6. 임부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- (1) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- (3) 오용(잘못사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온 (1~30℃) 보관**【사용기한】** 외부포장에 표기**【포장단위】** 60 C, 120 C

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "소비자 분쟁 해결 기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.siniilpharm.com

제조사
코스닥상장
신일제약(주)
충청북도 홍주시 동성면 평안리 50-1

제조사
알앤피코리아(주)
경기도 하성시 함남로 상선리 90-9



분리배출

설명서 개정년월일 : 2010.08.26