

원더칼DTM 췌어불정

일반의약품

비타민D 함유 칼슘제제

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.

작 용 · 특 성 : 칼슘은 뼈의 구성성분 중 가장 많은 부분을 차지하며, 뼈의 성장과 유지에 없어서는 안되는 성분입니다. 나이가 증가함에 따라 칼슘흡수가 감소되고 신장에서의 칼슘 배설이 증가됩니다. 또한 부적절한 칼슘 섭취로 혈중 칼슘이 감소하면 뼈에서 칼슘이 빠져나와 골밀도가 더욱 감소할 수 있습니다. 비타민D는 골격성장 및 유지, 무기질의 항상성 유지에 필수적인 호르몬이고, 골다공증의 예방과 치료 뿐 아니라 골격계 이외의 조직에서도 중요한 역할을 합니다. 자외선에 의해 피부에서 생성되고 일부는 음식으로 흡수되지만, 나이가 들면 비타민 D의 합성이 충분하지 않기 때문에 비타민D 섭취가 필요합니다. 원더칼 D췌어불정은 구연산칼슘과 더불어 비타민D가 함유된 칼슘제제입니다. 구연산칼슘의 흡수에는 위산이 필요하지 않아 식사와 관계없이 복용할 수 있으며, 위산분비가 적은 노인환자의 칼슘흡수에 좋습니다.

원 료 약 품 의 : 매 정량
분 량 구연산칼슘(USP).....850mg
(칼슘으로서 179.14mg)
폴레칼시페롤농축분말(BP).....5mg
(비타민 D₃로서 500IU)

성 상 : 백색의 원형 정제

효 능 · 효 과 : 1. 다음 경우의 비타민 D의 보급
- 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
3. 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

용 법 · 용 량 : 12세 이상 및 성인 : 1일 1회 2정
36개월 ~ 12세 : 1일 1회 1정
입안에서 녹이거나 씹어서 복용합니다.

사 용 상 의 : 1. **경고**
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.

2. **다음 환자에는 투여하지 마십시오.**
1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정용, 신질환 환자

- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아
- 4) 신결석 환자
- 5) 중증의 신부전 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여를 피합니다.
- 3) 임부, 수유부
- 4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 감심제당제를 투여 중인 환자

4. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 3) 장기간투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 합니다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다.
- 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 임부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 율 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관 합니다.
- 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【주의】

- 1) 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용이 되지 않도록 주의하십시오.
- 2) 제품 개봉시 또는 취급시 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

저 장 방 법 : 밀폐용기에 넣어 실온(1 ~ 30℃)에 보관하십시오.

포 장 단 위 : 원터칼D휴어블정 30, 120, 300정

구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

TM= Trade Mark

IO2 · 070110



종근당

본사 : 서울특별시 서대문구 총정로 37가 368
공장 : 충남 천안시 서북구 성거읍 오색달리 15-20
구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)

이 첨부문서 작성일자(2010. 8. 30)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지(www.cskpharm.com)나 구입처 문의 및 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.