

[illegible]

9) 티아지드계 이뇨제와 아래 약물을 병용투여시 상호작용이 있을 수 있다.

- ① 알코올, 바르비탈 유도체, 마약류 또는 항우울제류 : 기립성 저혈압이 더 심해질 수 있다.
- ② 항당뇨 약물들(경구용 약물, 인슐린) : 혈당노약물의 용량조절이 필요할 수 있다.
- ③ 베타브로민 : 혈당강화제와 조인하면 동맥투석에 안. 치료효과가 떨어진다.

[illegible]

6. 임부 및 수유부에 대한 주의
1) 임부 : 안지오텐신 II 수용체 길항제의 사용은 임신 1기 3개월 동안은 권장되지

나쁘다. 따라서 예방책으로 이 악은 임신 초기 3개월동안은 태아를 보호해서
 나쁘지 않게 하고, 임신을 계획하는 경우 미리 적절한 치료법으로 대치하여 한다. 만약
 임신 40주째나 39주째 감기의 지속적 발열과 필수수치에 걸리면, 임신을 계속할 수
 없는 일부의 사용에 대해 신중을 표하며 일단 해방한다. 다른 고열일 치료에
 한하여 한다. 임신이 진전된 경우에는 가능한 일의 안지출이나 수유제 치환의
 치환을 중단하여 하며, 만약 안지출이나 다른 치료로 치환을 지속하여 한다. 임신
 27 일, 31 일, 3개월 동안, 임신 40주째나 39주째 감기의 지속적 발열은 태아

[illegible]

- 2) 이 약의 작용효과에 대하여 대개는 현행 법령 상의 효능을 인정하여 대용적 목적 외의 용도를 한다. 복용 후 경과기간 및 중증의 강도에 따라 조정한다. 그 복용 유무와 개시/중지과 위약효과를 하는 것도 현 법령이다. 과량에서 치사시 사망률도 높고 임종과 내과적 대응책에 대한 공급여부도 있다. 사용법에 잘 지켜서 복용을 과량하여서 치사하는 대에는 없다. 열악한 환경에서 항생제로서 제1차로 쓰는 것, 항생제로서 하도록으로 쓰이지는 않거나 얼마나 제제하는 것은 알지못하는 것.
8. 보편 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

저장방법

가열용기, 실온(~30℃) 보관

포장단위

저사포장단위

• 본 의약품은 KCPM* 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입하신 의약품이 본사의 변별 부호(바코드)나 순환용 의약품에 주어진 바코드 및 의약품 포장지 등을 통하여 고환하여도 됩니다. 제품에 관한 문의 및 약 제류 문의의 작성일자 (2012) 10월 15일이며 변경된 내용의 확인은 홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로바서비스(수신자료공부팀) 080-900-0065로 하시기 바랍니다.

제조의회사

 SINCE 1981
YUYU (주)유유제약

본사 · 공장 : 충북 제천시 마이오빌로 1로 94
www.yuyu.co.kr

제조사
DASAN
nuo dachem

충남 아산시 도고면 덕암산로 332

LT1008-00