

관절통, 요통, 신경통

루마칼 플러스 *Rumacal Plus*

연질
캡슐

퇴행성 관절염은 관절을 구성하는 성분중 연골과 그 주위의 뼈에 퇴행성 변화가 나타나서 생기는 관절염으로 주로 체중을 많이 받는 관절, 즉 무릎관절, 엉덩이 관절 등에 심한 통증이 나타납니다. 특히 폐경기 이후의 여성은 에스트로겐 부족으로 골다공증의 위험성이 증가하므로 그 예방이 중요합니다.

루마칼 플러스 연질캡슐에 함유된 황산콘드로이틴은 연골에 영양을 공급하며 관절연골의 손상을 막아 연골재생에 효과적이며, 또한 비타민 B군이 함께 처방되어 있어 신경통, 근육통, 관절통의 완화에 효과적입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐(1,585mg)중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	✓300.0mg
티아민질산염(KP)	✓25.0mg
토코페롤아세테이트(비타민E로서 50IU)(KP)	✓50.0mg
판토텐산 칼슘(KP)	✓30.0mg
니코틴산아미드(KP)	✓30.0mg
피리독신염산염(KP)	✓30.0mg
0.1%시아노코발라민(시아노코발라민으로서 30μg)(KPC)	✓30.0mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호	

【성 상】 미황색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급
 - 육체 피로 - 임신·수유기 - 병중·병후의 체력저하시 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨결림, 어깨통증) 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로

【용법·용량】 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 씹 식후 복용

【사용상 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아(젖먹이, ~~산난아기~~)
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 1세미만의 영아(젖먹이, ~~산난아기~~)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히투여해야 하는 환자
3. 이상반응
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은변
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 6) 고용량 투여에 의해 소화성 장애를 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용한다.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 레보도파 약물과 병용(함께 복용(사용))투여 하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용), 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관 하십시오.
- 설명서 작성일자(2011년05월)이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인 하실 수 있습니다.
- 소비자 상담실 : 02-568-0051
- 반품 및 교환처 : 02-569-5662

설명서 개정일 2011.05

제조원



경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6

알앤피코리아(주)

최대웅제약 계열사