

○ 탑스타틴정 10mg, 20mg

로수바스타틴칼슘

분류번호:218

전문 의약품

TOPSTATIN

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- | | |
|--|---------|
| · 탈수타민정 10mg
로수바스타틴칼슘(별규)
(로수바스타틴으로서 10mg) | 10.40mg |
| · 탈수타민정 20mg
로수바스타틴칼슘(별규)
(로수바스타틴으로서 20mg) | 20.80mg |
- 제1차(동률유래) : 유통수확물 <원동물 : 소, 사용부위 : 우유>

【성 상】 분홍색의 원형 필름코팅정제

【내용량】 28정

【호봉·효과】

1. 원발성 고콜레스테롤혈증(type Ia), 복합형 고지혈증(type IIb) : 식이 및 운동으로 조절이 안 될 경우 식이요법의 보조제
2. 동형결합 가족성 고콜레스테롤혈증에 식이요법이나 다른 저지혈하요법(예 : LDL 분리반포제)의 보조제
3. 고콜레스테롤혈증 환자에서 총콜레스테롤과 LDL-콜레스테롤을 목표 수준으로 낮추어 죽상동맥경화증의 진행을 지연
4. 원발성 이상체디디노프로테인혈증(type III) 환자의 식이요법 보조제
5. 심혈관 질환에 대한 위험성 감소 : 관상동맥 심질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 만 50세 이상의 남성 및 만 60세 이상의 여성으로 고감도 C-반응단백(high sensitive C-reactive protein, hsCRP)이 2mg/L 이상이며, 적어도 하나 이상의 추가적인 심혈관질환 위험 인자(예 : 고혈압, 낮은 HDL-콜레스테롤치, 흡연 또는 조기 관상동맥에 심질환의 가족력 등)를 가진 환자의
- 뇌졸중에 대한 위험성 감소
- 심근경색에 대한 위험성 감소
- 동맥 혈관재형성에 대한 위험성 감소

【용문 · 용강】

1. 원발성 고콜레스테롤혈증(type I), 복합형 고콜레스테롤혈증(type II) 원발성 이상지질혈증 포도당대사장애(type III) 및 동맥경화 기증성 고콜레스테롤혈증
- 이 약을 투여전 및 투여종결후는 표준 콜레스테롤 지표를 지켜야 하여야 하며, 이를 치료기간동안 지속하여야 한다. 식사와 상한없이 하루 중 아무때나 이 약을 투여할 수 있다. 초저지방은 1일 1회 5밀리그램이며, 더 많은 LDL-콜레스테롤을 낮추기 위해 필요한 경우 유지용량으로 조절하여 투여할 수 있다. 유지용량은 1일 1회 10밀리그램으로 대부분의 환자는 이 용량에서 조절된다. 유지용량은 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 LDL-콜레스테롤 수를, 치료목표 및 환자의 반응에 따라 적절히 조절하여야 하며, 1일 최대 20밀리그램까지 증량할 수 있다.
2. 노인: 용량조절이 필요하지 않다.
3. 심부전환자: 정중 및 중등도 심부전 환자의 경우 용량을 조절할 필요가 없다. 중증의 심부전 환자에게는 투여하지 않는다. 중등도 심부전 환자에게 이 약 20mg 투여 시 각별히 주의하여야 한다.
4. 간부전환자: Chd-Pugh 점수가 7 이하인 경우에는 로수바스타틴의 전신 노출 증가가 나타나지 않았다. Chd-Pugh 점수가 8 또는 9인 환자에게는 증가하였다. 이러한 환자에서는 신기능 검사기 고려되어야 한다. Chd-Pugh 점수가 9를 초과하는 환자에 대한 투여 경험은 없다. 황폐성 간질전환 환자에게 이 약을 투여하지 않는다.
5. 인종: 아시아계 환자들에게 이 약의 전신노출이 증가하기 때문에, 권장 초기 용량은 5밀리그램이다. 40밀리그램 용량 투여는 금기이다.
6. 간병증에 걸리기 쉬운 환자: 간병증에 걸리기 쉬운 환자들의 권장 초기 용량은 5mg이다. 이러한 환자를 중 및 고혈압에 이 약 40mg 용량 투여는 금기이다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환지에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약의 구성성분과 과민증이 있는 환자
 - 2) 원인 불명의 지속적인 혈청 트랜스아미나제 상승 또는 정상 상한치의 3배를 초과하는 혈청 트랜스아미나제 상승을 포함하는 활동성 간질환 환자
 - 3) 간병증 환자
 - 4) 사이크로스포린 병용투여 환자
 - 5) 중증의 신부전의 신소산소 환자 (creatinine clearance (CLcr) <30mL/min)
 - 6) 임부 및 수유부, 적절한 피임을 받방비 사려하지 않는 가임여성
출산이 가능한 연령의 여성에 이 약을 투여시 임신하지 않을 가능성이 높은 경우
와 태아에 대한 잠재적인 위험성에 대해 알려주었을 때만 투여한다.
 - 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance),
Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡
수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는
투여하지 안된다.
 - 8) 간병증/황문공해증에 걸리기 쉬운 환자들에게 이 약 40mg 용량 투여는 금기
이다. 이러한 인자들은 아래와 같다.
- 중증도의 신산소 (크레아티닌 청소율 < 60mL/min)
- 감상신기능저하증
- 유전적인 근질환 병력 또는 가족력이 있는 경우
- 다른 Hmg-CoA 환원효소 또는 피브린에 계열 약물에 대한 근육 독성의 병력이 있는 경우
- 알코올 중독
- 혈장 농도가 증가할 수 있는 상황
- 아시아계 환자
- 피브린에 계열 약을 병용투여
2. 다음 환자에는 신중하 투여할 것.
- 1) 다른 Hmg-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 이 약은 알코올을 과다 섭취하거
나 간 질환의 병력이 있는 환자에서 마취후 주의해야 한다. 이 약 투여 시작

및 그 후 임상적 필요에 따라 반복하여 간호소 검사를 실시할 것을 권고한다. 갑상선기능저하증이나 신증후군에 의한 2차적 고콜레스테롤혈증 환자는 이 약을 투여하기 전에 원인 질환을 치료해야 한다.

- 2) 다른 Hmg-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 골격근에 대한 효과, 예를 들면 합성작용에 설명되지 않는 근육통 및 근병증, 드물게 횡문근융해증이 이 약물 투여받은 환자에서 보고되었다.
- 3) 다른 Hmg-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 근병증/횡문근융해증에 걸리기 쉬운 요인을 갖고 있는 다음의 환자에서는 치료의 위험성과 유익성이 고려되어야 하며, 임상 모니터링이 권장된다. 치료전에 CK(Creatine Kinase)값이 기저수준에서 유의성있게 증가(정상 상한치의 5배 이상 증가)되어 있는 경우 치료를 시작해서는 안된다.
- 4) 신손상 환자
- 5) 갑상선기능저하증
- 6) 유전적인 근질환의 병력 또는 가족력이 있는 경우
- 7) 다른 Hmg-CoA 환원효소 저해제 또는 파피레이트에 대한 근육 독성의 병력이 있는 경우
- 8) 알코올 남용
- 9) 70세 이상의 노인
- 10) 혈장 효소가 증가할 수 있는 상황
- 11) 파피레이트 계열 약물 병용투여
- 12) 치료 중에는 특히 근대칭이나 열과 관련이 있을 경우, 다른 이유로 설명되지 않는 근육통이나 근허, 경련을 즉시 보고하여야 한다. 이러한 환자에서 CK치를 측정하여 상한치 이하의 CK가 현저히 상승되거나(정상 상한치의 5배 이상 증가), CK치가 정상 상한치와 5배 이하로 떨어지지 않거나 월지라도 근육 증상이 심하고 일상의 불편함을 야기한다면 이 약의 투여를 중단하여야 한다. 증상이 해결되고 CK치가 정상으로 돌아간 뒤면 명확한 모니터링과 함께 이 약 또는 다른 Hmg-CoA 환원효소 저해제를 최저 용량으로 재시작할 것을 고려해야 한다. 무증상인 환자에서 일관적인 CK치의 모니터링은 필요하지 않다.
- 13) 측정 결과의 해석을 어렵게 할 수 있으므로 격렬한 운동 후나 CK값을 증가시킬 수 있는 기타 원인이 있는 경우는 CK를 측정하지 않도록 한다. CK값이 기저상태에서 유의성있게 증가(정상 상한치의 5배 이상 증가)한 경우 5-7일 내에 환자상태가 수평화되어야 한다. 시혈 반복시에도 기저상태의 CK값이 정상 상한치의 5배 이상 증가한 경우 이 약을 투여하지 않는다.
- 14) 근병증이나, 횡문근융해증에 부차적인 심부전으로 악화될 것을 암시하는 급성 호흡 실태(예를 들면, 폐혈종, 저혈압, 다수혈, 창상, 중증의 대사성/내분비성/전해질질 질환, 조혈되지 않은 간질병증)에서는 이 약의 투여를 중단해야 한다.
- 15) 임상시험에서 이 약과 다른 약물 병용 투여한 소수의 환자에서 골격근에 대한 효과와 증가된 증가가 없다. 그러나 다른 Hmg-CoA 환원효소 저해제와 피브린 산 유도제(펩티도분해, 사이로소프린, 니로탄산, azole계 항진균제, protease 억제제, macrodide 합성제)를 투여받은 환자에서 근육과 근병증의 빈도가 증가했다. 펩티도분해는 Hmg-CoA 환원효소 저해제와 병용시 근병증의 위험을 증가시킨다. 따라서 이 약과 펩티도분해의 병용은 추천되지 않는다. 이 약을 피브린, 이트나, 나리신과 병용투여시 유의성과 위험성을 주의 깊게 평가하여야 한다.
- 16) 파피레이트 계열 약물 병용투여할 때 이 약 40mg 용량은 불가하다.
- 17) 고용량 특히 40mg 용량 환자에서, dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분이 세뇨관 기원의 단백뇨가 관찰되었다. 이것은 일반적으로 일시적이고 근성 또는 전신성 신부전의 예측 인자는 아니다. 40mg 투여 환자의 추적검진등검사는 신기능을 검사할 필요하지 않다.
- 18) 약동학 시험에 의하면 코카아인과 비교시 아시아인에게 전신 노출의 증가(AUC 및 Cmax의 중앙값이 약 2배 증가)가 나타났으므로 아시아인에게 용량조정이나 신기능을 시험할 필요가 없다.
- 19) 만 10-16세의 소아환자 : 로수바스타틴을 복용한 소아 환자에서 Tanner staging에 의한 이차 성징 및 성형 성장(기), 체중, BMI(body mass index)의 평가는 1년으로 제한하였다.
- 이상반응**
- 1) 보고된 이상반응은 일반적으로 경미하고 일시적이다. 이상반응으로 연구를 중단한 환자는 이 약 투여군중 4% 미만이었다. 이상반응의 발현빈도는 다음과 같이 분류하였다:
- 흔하게 ($\geq 1/10$, $\geq 1/10$); 때때로 ($\geq 1/1,000$, $\geq 1/100$); 드물게 ($\geq 1/10,000$, $\geq 1/1,000$); 매우 드물게 ($\geq 1/10,000$).
- 알려지지 않은 (확률상 있을 수 있는 자료로부터는 추정할 수 없다).

발현부위	증상별 발현빈도		
	흔하게	때때로	드물게
면역계			혈관부종을 포함한 과민반응
내분비계	당뇨 ⁸⁾		
신경계	두통, 어지러움		
위장관계	변비, 구역, 복통, 열풍증		췌장염
피부 및 피하조직		가려움증, 발진 및 두드러기	
근골격계 및 결합조직	근육통		근육염증(근육통 포함), 원문근육해상증
전신	무력증		

제조사

DaeWON 대원제약

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386

공장: 경기도 화성시 향남읍 제갈공단 1길 24



제조의뢰자

대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남부순환로 2038

공장:강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

<http://www.dhpharm.co.kr>

주) : JUPITER 임상시험에서 공복시 혈당이 5.6 ~ 6.9 mmol/L 환자에서 가장 많이 보고됨 (로수바스타틴 투여군 2.8%, 위약군 2.3% 보고)
 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 용량 증가에 따라 이상반응이 증가하는 경향이 나타났다.

2) 신장에 미치는 영향 : Dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분의 세뇨관 기원 인 단백뇨가 관찰되었다. 노년백이 음성 또는 극소량에서 ++ 이상으로 전환 되는 현상이 10, 20밀리그램에서는 1%이며, 40밀리그램에서는 약 3%에서 나타났다. 노년백이 음성 또는 극소량에서 +로 약간 증가하는 것도 20밀리그램 용량에서 관찰되었다. 단백뇨는 대부분의 경우 치료 도중 감소하거나 자발적으로 사라졌으며 급성 신장 기능은 진행성 신부전의 예측 인자는 아니었다. 이 약을 투여한 환자 및 임상시험자로부터 혈뇨가 관찰되었으나, 발현빈도는 낮았다.

3) 근육경직에 미치는 영향 : 급성 신부전과 함께 또는 급성 신부전 없이 근육경직에 미치는 영향(예: 근육통, 근육병증(근육염 포함), 드물게 횡문근융해증 등)이 이 약 모든 용량의 치료환자(특히 20밀리그램 이상)에서 보고되었다. 로수바스타틴을 투여받은 환자군에서 creatinine kinase(CK) 수치가 용량 의존적으로 증가하였다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었다. creatinine kinase(CK) 수치가 현저히 증가(정상상한의 5배 이상 증가)하는 경우 일시적으로 치료를 중단하여야 한다.

4) 간에 미치는 영향 : 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로, 이 약을 투여받은 소수의 환자에서 트랜스아미나제치가 용량 의존적으로 증가하였다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었다.

5) 시판 후 사용경험
 위의 이상반응에 대하여 다음의 이상반응이 시판 후 조사동반 보고되었다.
 - 신장계 : 매우 드물게 다발성신장병증, 기형성실
 - 호흡기계 및 흉부 : 기침, 호흡곤란 (빈도 불명)
 - 위장관계 : 설사(빈도 불명)
 - 간담도계 : 매우 드물게 황달, 간염, 드물게 트랜스아미나제 증가
 - 피부 및 피하조직 장애 : 스티븐스-존슨 증후군(빈도 불명)
 - 근육계 : 매우 드물게 관절염
 - 신장 : 매우 드물게 혈뇨
 - 기타 : 부종 (빈도 불명)

일부 스타틴계열 약물과 관련하여 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

- 정신장애 : 우울증, 수면장애(불면 및 악몽 포함)
 - 호흡기계 : 특히 장기투여시 간질성 폐질환과 같은 예외적 사례
 - 비노생식기계 : 성적 기능이상
 - 간담도계 : 치명적 및 비치명적 간부전
 스타틴 사용과 관련하여 시판 후 인지장애가 드물게 보고되었다. (예, 기억력감퇴, 건망증, 기억상실증, 기억장애, 혼동) 이러한 인지장애는 모든 스타틴 계열 약물에서 보고되었다. 이러한 보고들은 일반적으로 심각하지 않고 약물 사용중단 후 기억력이며, 증상발생 시점(1일~수 년) 및 증상개시(중간치환 3주)는 편차가 있다.
 6) 만 10~만 17세의 소아환자
 만 10~만 17세의 소아환자를 대상으로 실시한 52주 동안의 임상시험에서 운동 및 증가된 신체 활동 후 정상 범위의 산화지 10배를 초과하는(10xULN) creatinine kinase 수치 상승이 심한 발진에 비해 좀 더 빈번하게 관찰되었다. 다른 시험에 대해 소아환자의 안전성 프로파일은 성인과 유사하였다.

4. 일반적 주의

1) 간질성 폐질환 : 일부 스타틴계열 약물과 관련하여 특히 장기 투여시 간질성 폐질환과 같은 이례적인 사례가 보고된 바 있다. 발현되는 양상으로는 호흡곤란, 비생식성 기침 및 일반적 건강의 악화(피로, 체중감소 및 발열)가 포함될 수 있다. 환자가 간질성 폐질환으로의 발전이 의심될 경우에는 스타틴 약물 치료를 중단하여야 한다.

2) 이 약을 포함하여 스타틴 계열 약물을 복용한 환자에서 치명적 및 비치명적 간부전 시판 후 사례들이 드물게 보고되었다. 이 약 투여 중 임상적 증상이 있는 심각한 간손상 및/또는 고빌리루빈혈증 또는 황달이 발생한 경우 즉시 치료를 중단한다. 다른 병인이 발견되지 않은 경우 이 약을 재투여하지 않는다.

3) 동 제제를 포함한 HMG-CoA 환원효소 억제제 투여시 HbA1c 및 공복 혈당 수치 증가가 보고되었다.
 4) 당뇨병 : 향후 당뇨병이 발생할 위험성이 높은 몇몇 환자들에게서 적절한 당뇨병 치료를 요하는 과혈당증을 유발할 수 있다는 몇 가지 증거가 제시되었다. 그러나 스타틴 제제의 혈관성 위험성 감소효과는 이러한 위험성을 상회하므로 스타틴 치료 중단이 사유가 될 수 없다. 위험성이 있는 환자(공복혈당 5.6~6.9 mmol/L, BMI)30kg/m² 중상지방조직이 상승 고혈압들은 진료지침에 따라 임상적 및 실험실적 수치 모니터링을 실시해야 한다.

JUPITER 연구에서 공복혈당이 5.6~6.9 mmol/L인 환자들에서 보고된 당뇨병 발생 총빈도는 로수바스타틴투여군에서 2.8%, 위약군에서 2.3%이었다.

5. 상호작용

1) 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로, 비타민 K 길항제(예:와파린)를 병용투여하는 환자에서 이 약으로 치료를 시작하거나 이 약의 용량을 증가시킬 경우, INR이 증가될 수 있다. 이 약을 중단하거나 용량을 감소시키면 INR이 감소될 수 있다. 이 경우, 적절한 INR 모니터링이 권장된다.
 2) 사이크로스포린과 병용시 로수바스타틴의 혈장 농도가 건강한 지원자보다 평균 7배 증가되었다. 로수바스타틴과 사이크로스포린의 병용투여는 사이크로스포린의 혈장농도에 영향을 미치지 않는다.
 3) 겐피로브릴과 병용시 로수바스타틴의 최고혈중농도와 AUC가 2배 증가하였다. 특정한 상호작용 자료에서 페노피브레이트와 약물동태학적 관련 상호작용은 없으며, 약물동태학적 상호작용은 발생할 수 있다. 겐피로브릴, 페노피브레이트, 다른 피브레이트 계열 약물 및 지질저하용량(1일 1g 이상)의 니코틴산은 단독 투여했을 때 큰변동을 일으킬 수 있기 때문에, HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용투여했을 때 큰변동 위험성을 증가시킨다. 피브레이트 계열 약물을 병용투여할 때 이 약 40밀리그램 용량 투여는 금기이며, 투여 초기 용량으로 5밀리그램을 투여해야 한다.

4) 수산화알루미늄, 수산화마그네슘을 함유하는 제산제와 이 약을 병용 투여한 결과, 로수바스타틴의 혈장 농도가 약 50% 감소되었다. 그러나 이 효과는 제산제를 이 약 투여 2시간 후에 투여했을 때에 완화되었다. 이 상호작용의 임상적 관련성은 연구되지 않았다.

5) 생체내·외 시험 결과, 로수바스타틴은 cytochrome P450 동위효소의 저해제나 유도제가 아니다. 또한, 로수바스타틴은 이러한 동위효소에 대한 좋은 기질이 아니다. 로수바스타틴과 플루토코놀(CYP2C3, CYP3A4의 저해제) 또는 케토코나졸(CYP2A6, CYP3A4의 저해제) 사이의 상호작용은 관찰되지 않았다. 이트라코나졸(CYP3A4의 저해제)과 병용투여시 로수바스타틴의 AUC가 28% 증가하였으나 이러한 증가는 증가는 임상적인 의미가 없는 것으로 생각된다. 따라서 cytochrome P450 매개성 대사에서 유래하는 약물 상호작용은 일어나지 않을 것으로 예상된다.

6) 상호작용 시험에 근거할 때 디곡신, 페노피브레이트와 임상적으로 유의한 상호작용은 없다. 젬페피로브릴, 다른 피브레이트, 니아신의 지질 저해 용량(1g/day 이상)과 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용 투여시 큰변동의 위험을 증가시킬 수 있는데 이는 아마도 이 약물들이 아마도 단독 투여시에 큰변동을 야기할 수 있기 때문이다.

7) 에리스로마이신과 병용시 로수바스타틴의 AUC(0-4)가 20% 감소되고, 최고혈중 농도가 30% 감소되었다. 이러한 상호작용은 에리스로마이신에 의한 장 운동성 증가에 의해 야기될 수 있다.

8) 경구용 피임제와 병용투여시, ethinyl oestradiol or norgestrel의 AUC가 각각 26%, 34% 증가되었다. 경구용 피임제의 용량 선택시 이러한 혈장 농도의 증가를 고려하여야 한다. 이 약과 HRT를 병용하는 환자의 약독화 효과가 없으므로 유사한 효과를 배제하여서는 안된다. 임상시험시 여성에서 병용 투여가 많았으며 내약성은 우수하였다.

9) 단백분해효소 저해제 : 비록 정확한 상호작용 기전이 밝혀지지 않았으나, 단백분해효소 저해제는 이 약의 효소를 강하게 증가시킬 수 있다. 건강한 피험자를 대상으로 한 약물동태시험에서 이 약 20밀리그램 용량과 두 개의 단백분해효소 억제제 (로파나비어 400밀리그램 / 리토나비어 100밀리그램)를 병용투여했을 때 이 약의 항정상태 AUC(0-24) 및 최고혈중농도를 각각 2배 및 5배 증가시켰다. 그러므로, 단백분해효소 저해제를 투여받는 HIV환자들에게 이 약을 병용투여하는 것은 권장되지 않는다.

6. 임부 및 수유부에 대한 주의

임신 및 수유부에 대한 이 약의 안전성은 확인되지 않았으므로 임신 또는 수유중에 사용하면 안된다.

임신 기능성이 있는 여성은 적절한 피임법을 사용해야 한다. 콜레스테롤 및 콜레스테롤을 생산한 성질은 태아의 발달에 있어 필수적이므로 HMG-CoA 환원효소를 저해하여 발생하는 잠재적 위험성이 임신 중 치료하여 얻게 되는 유익성을 상회한다. 동물시험에 의하면 제한된 생식독성의 증거가 있다. 이 약을 사용하는 동안 임신할 경우 즉시 복용을 중단하여야 한다. 로수바스타틴은 젖의 모유로 이행된다. 사람에서의 모유로의 이행에 대한 데이터는 없다.

7. 과량투여시의 처리

과량 투여시 특별한 처치 방법은 없다. 과량 투여 시에는 대증요법 및 보조 치료 행해져야 한다. 2시간 및 6시간을 모니터링 해야 한다. 혈액 투석은 도움이 되지 않는 것으로 보인다.

8. 적응상의 주의

이 약이 운전이나 기계작동능력에 영향을 대한 시험이 수행되지 않았으나 약력학적 특성에 근거할 때 영향을 미치는 것으로는 보이지 않는다. 운동이나 기계작동시 이 약 투여로 인하여 어려움을 수 있음을 고려하여야 한다.

9. 기타

1) 일반약리시험, 반복투여독성시험, 유전독성시험, 발암성시험, 근구한 전임상 자료에 의하면 사람에 대한 특별한 위험은 없다. 랫드의 출생 전후 발생시험에서, 동복자 크기 감소, 동복자 무게 감소, 차세대 생존 감소 등 생식 독성이 나타났다. 이러한 효과는 치료 용량의 수배에 해당하는 용량을 모체에 전신 투여하였을 때 나타났다.

2) 약독학 시험에 의하면 마시미안(일본, 중국, 필리핀, 베트남, 한국)에서 코카시아인과 비교시 AUC 및 Cmax중간값이 1/2배 증가하였다. 인구학적 약독학 분석에 의하면 코카시아인과 흑인간에 임상적으로 의미있는 약독학 차이는 없었다.

【저장방법】 기밀봉지, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 28정

【사용기간】 제조일로부터 24개월

* 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효기간)이 경과하였거나, 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2014년 02월 03일) 이후 변경된 내용은 대표처와 홈페이지 마다게팅팅(080-855-0114)으로 문의하시기 바랍니다.

* 의약품 용이성명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인 의약품사전(<http://drug.atis.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.

첨부문서 개정일 : 2014년 02월 03일