

카엘 정

Kael tab.

조제용

500정

일반의약품 분류번호:114 KGMP적격업체

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

에페드린염산염(KP) 13 mg
아세트아미노펜(KP) 200 mg
카페인무수물(KP) 10 mg
첨가제(타르색소): 황색 5호

【효능 및 효과】 감기의 증상(기침, 가래, 인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 및 용량】 만 15세 이상 ~ 성인 : 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

【성 상】 주황색의 원형 정제

【사용상의 주의사항】

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으키는 적이 있는 사람 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍

증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약 4. 다음과 같은 사람은 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구도를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) 2) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다. 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키는 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 전신, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 5) 긴장질환, 심장질환, 심장정지, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양 등이 있는 사람, 6) 령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈 문제를 가지고 있는 사람 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 9) 이 약은 황색5호(설페일로우FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분으로 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이첨부문서를 소지할 것. 1) 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우 - 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종, 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타날 경우 ① 속(아나필락시스): 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴 답답함 등과

함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부점막인종후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해리얼증후군: 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달, 피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. 3~5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 6. 기타 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용 시에는 음주하지 말 것. 4) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 7. 저장상의 주의 사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 【제조자】 조아제약(주) <http://www.choa.co.kr> 본사: 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 공장: 경남 함안군 함안면 파수리 466 【수신자부담고객 상담실】 080-988-8889 ※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오. ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다. ※ 본 표시사항의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어 주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오. ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관 하여야 합니다.

제조번호:

사용기한:

