

우비디 캡슐

Rev.00

(주)한국글로벌제약

분류번호 : 건강기능식품(03910)

Rev.00

우비디 캡슐

■성분 및 그 함량 : 1 캡슐 중

비페닐디메틸디카르복실레이트(별규) 125mg

(비페닐디메틸디카르복실레이트로서 12.5밀리그램)

우로스도옥시물산(JP) 50mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의우유)

■성상

원색의 분말을 함유한 상하부 흰색의 경질캡슐제

■효능·효과

지속적으로 SGPT가 상승되어 있는 만성지속성 간염

■용법·용량

보통 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 경구 투여한다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

- 1) 원전담도 폐쇄가 있는 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것

- 1) 만성 활동성 간염환자
- 2) 간경화 환자
- 3) 저칼륨혈증이 있는 환자
- 4) 심한 재장 질환이 있는 환자
- 5) 소화성 궤양이 있는 환자
- 6) 담석증 환자

3. 이상반응

- 1) 소화기 : 때때로 설사, 구역, 구토, 드물게 복통, 변비, 가슴앓이, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 때때로 가려움증, 드물게 발진 등의 과민증상이 나타날 수 있다. 간혹 피진이 생길 수 있으나 일반적으로 항과민약을 함께 사용하면 소실된다.
- 3) 일과성 황달이 나타날 수 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
- 4) 기타 : 드물게 전신권태감, 헛기이 나타날 수 있다.
- 5) 국내 시판 후 조사결과
국내에서 재상사를 위하여 6년 동안 640명의 만성지속성간염환자를 대상으로 실시한 시판 후 사용안전성조사결과 유효사례 및 약물유해반응 발현율은 0.31%(2명/640명, 3건)로 보고되었으며, 간경화, 복수, 급성 C형 간염 각각 0.16%(1명/640명, 1건)로 조사되었다. 모두 중대하고 예상하지 못한 약물유해반응이며, 이 약과의 인과관계를 배제할 수 없었다.

4. 일반적주의사항

- 1) 정확한 용법 용량을 지킬 것
- 2) 장기간 (최대8주)의 복용에도 불구하고 증상의 개선이 없거나, 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
- 3) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

5. 임신부예대한 투여

동물 실험에서 태아독성이 보고되어 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 상호작용

경구 당뇨병약(글리시미드 등)과 병용 투여시 경구 당뇨병약의 작용이 증가 될 수 있으므로 신중히 투여할 것

■사용(유효)기간 : 제조일로부터 36개월

■저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■포장단위 : 자사포장단위

■제조사 : (주)파머링, 충청북도 음성군 김곡면 행궁이길 87-17

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준을 위한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 사용(유효)기간을 반드시 확인하시고 복용하여 주시기 바랍니다. 사용(유효)기한이 경과 되었거나 유통 과정 중에 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입 했을 때에는 구입한 약국이나 병의원을 통해 교환해 드립니다. (소비자상담실 : 041-951-4300)

※ 설명서 작성된 이후 변경내용은 온라인 약의도서(<http://drug.mds.go.kr>) 의약품 정보 또는 당사 홈페이지(www.globalpharm.co.kr)의 각 제품 판매 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

약은 어린이 손에 닿지 않게 보관해야 합니다.

작성일자 2015년 02월 12일

제조의회사



(주)한국글로벌제약

충북 서천군 중천면 중천로32번길 26