

코엔자임큐텐을 함유한
비타민·미네랄 종합영양제

코큐비타엠 정

분류번호:319(기타의 비타민제)

인체는 정상적인 생리현상과정과 외부환경에 의해서 체내에 활성산소가 생성되며 이것이 노화, 혈액순환장애, 암 등의 원인이 되는 것으로 알려져 있습니다.

코큐비타엠은 대표적 항산화 성분인 코엔자임큐텐(유비데카레논), 셀레늄, 비타민 A, C, E 아연 등이 함유되어 이러한 활성산소를 제거해주는 현대인에게 꼭 필요한 종합영양제입니다.

특히 코엔자임큐텐(유비데카레논)은 최근 일본, 미국, 유럽 등에서 크게 각광받고 있는 항산화물질인 동시에 체내 에너지원 생성에 중요한 물질입니다. 코큐비타엠은 이러한 코엔자임큐텐(유비데카레논)과 함께 각종 비타민, 미네랄이 포함되어 있어 육체피로 및 체력저하시에 도움이 될 것입니다.

【성분·함량】 1정 중

유비데카레논(약전).....	10mg
셀레늄함유건조효모(별규).....	32.26mg(셀레늄으로서 50μg)
건조레티놀아세테이트(별규).....	10mg(비타민A로서 5,000IU)
콜레칼시페롤과립(KPC).....	4mg(비타민D3로서 400IU)
토코페롤아세테이트50%(KPC).....	60mg(비타민E로서 30IU)
직타용아스코르브산97%(별규).....	309.3mg(아스코르브산으로서 300mg)
폴산(약전).....	400μg
티아민질산염(약전).....	10mg
리보플라빈(약전).....	10mg
니코틴산아미드(약전).....	100mg
피리독신염산염(약전).....	6mg
시아노코발라민(약전).....	18μg
판토텐산칼슘(약전).....	30mg
요오드화칼륨(약전).....	196μg(요오드로서 150 μg)
푸마르산철(약전).....	54.76mg(철로서 18mg)
산화아연(약전).....	31.12mg(아연으로서 25mg)
황산망간수화물(U.S.P).....	3.168mg(망간으로서 1mg)
철산화물(약전).....	11.48mg (칼륨으로서 5.2mg)
첨가제(타르색소)적색40호, 황색5호, 청색호	

【성상】 적갈색의 장방형 필름코팅제

【효능·효과】 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급:

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 눈의 건조감의 완화, 야맹증
- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
- 철결핍성 빈혈의 예방 및 치료
- 아연의 보급

【용법·용량】 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 임부에, 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여(복용)하지 않습니다. (비타민A 결핍증 환자는 제외)
- 2) 6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여(복용)하지 마십시오

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 4) 12개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 5) 과칼륨혈증 환자
- 6) 혈액소중(혈대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 7) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여(복용)하면 안됩니다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여(복용)하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피합니다.
- 4) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 회량의 수산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부, 수유부
- 6) 소화성 궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 7) 심장 순환기계기능 장애 환자
- 8) 신장애(신장장애) 환자

- 9) 저단백혈증 환자
- 10) 담낭관련 질환, 간질환 환자
- 11) 위장관 질환
- 12) 급, 만성 기관지염, 폐부종(부기)환자
- 13) 알칼리증, 소화성궤양

4. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
구역, 구역질, 구토, 설사, 위부불쾌감, 위장관장애, 소화장애, 변비, 가스참, 위장통증, 묽은변, 식욕부진, 복부팽만감, 두드러기, 가려움증, 알레르기반응, 혈관부종(부기), 광선과민증, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 복부(배부분)·위통증, 상복부통증, 경련(떨림), 건조하고 거친피부, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 관절통, 통증성 관절부종(부기), 열, 혼수, 호산구증가, 요도·중독증등, 과칼륨혈증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여에 의해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000IU이상을 넘지 않도록 합니다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시(함께복용) 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여(함께복용)하지 않습니다.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용, 테트라사이클린계 제제, 제산제
나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7.임부·수유부·미숙아·유아에 대한 투여(복용)

- 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 중심으로 하는 기형발현(드러냄) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
- 2) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 3) 임신 수유중 과량복용시 태아 및 영아(젖먹이, 갓난아기)의 갑상선기능장애 및 갑상선증을 유발할 수 있습니다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.
- 3) 오염(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보존·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30) 보관

【사용기한】 외부포장에 표기

【포장단위】 60정, 120정

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 최종작성일자(2010년07월05일) 이 후 변경된 내용은 소비자상담실(02-834-2607)에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려 주시기 바랍니다.
- * 제조원 : 알리코제약주 / 충북 진천군 광혜원면 회죽리 160-17

문안작성년월일 : 2010. 07. 05

제조의뢰·판매원
유한메디카
충북 청원군 오창읍 양천리 807-1

대표전화:02-834-2605~6 소비자 상담전화:02-834-2607

홈페이지 주소 : www.yuhanmedica.co.kr