



다이하벡스 XR[®] 서방정 1000mg

(메트포르민염산염)

[개요 및 특징]

다이하벡스는 제2형 당뇨병 치료제로 국내 외 여러 국가에서 당뇨병 치료의 1차 약제로 처방되고 있습니다.

다이하벡스는 인슐린 저항성 개선, 간에서 과도한 포도당 신합성 감소, 위장관에서 포도당 흡수 억제 등의 작용으로 혈당을 감소시킵니다. 또한, 당뇨병 치료제의 사용으로 나타날 수 있는 저혈당 위험이 낮아 안전하며, 체중 감소 작용도 있어 비만한 제2형 당뇨병 환자에게 적합한 약제입니다.

[성분·함량] - 1정 중 -

메트포르민염산염(MP) 1000mg

[성상] 흰색 내지 미색의 양면이 불룩한 타원형의 서방정입니다.

[효능·효과] 성인의 제2형 당뇨병

- 식사요법, 운동요법으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우 단독 투여합니다.
- 설뿐요소제와 병용투여할 수 있습니다.

[용법·용량] 투여용량은 개인별로 약물효과와 내약성을 근거로 결정되어야 하며, 1일 추천 최대 용량을 초과하지 않아야 합니다.

■ 단독투여

- 일반적인 초기용량은 1일 1회 염산메트포르민서방정 500mg을 저녁식사와 함께 투여합니다.
- 일주일 후에 혈당수치를 측정하여 용량을 조절해야 합니다. 위장관계 이상반응은 점진적인 용량증가로 개선될 수 있습니다. 최대용량은 하루 이 약 2000mg입니다.
- 용량을 증가할 때는 매 주 500mg씩 증가시켜야 하며, 하루 최대 2000mg까지 저녁식사와 함께 투여할 수 있습니다.
- 이미 메트포르민정으로 치료받고 있는 환자분에서는 본 제제의 초기용량은 속효성 메트포르민정의 1일용량과 동일합니다. 1일 2000mg이상의 속효성 메트포르민정을 복용하고 있는 환자분에서 본 제제로 전환은 추천되지 않습니다.

■ 병용투여

- 설뿐요소제와 병용투여시 각각의 약물의 용량을 조절함으로써 원하는 혈당에 도달할 수 있습니다. 그러나 혈당조절을 위한 각 약물의 최소 유효용량을 알아내기 위한 노력이 이루어져야 합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 1) 드물게 심한 유산산증(Lactic acidosis)을 일으킬 수 있습니다. (4.이상반응 1)대사와 영양장애 참조)
- 2) 인슐린, 설뿐요소제 약물 등 다른 당뇨병용제와 병용투여하는 경우, 드물게 중증의 저혈당을 일으킬 수 있으므로 주의합니다. (5.일반적주의 8)저혈당 참조)

2. 다음 환자분에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 심혈관계 허탈(속), 급성심근경색과 폐혈증과 같은 상태로부터 아가질 수 있는 신장질환이나 신기능부전(혈청크레아티닌치가 남자는 1.5mg/dL 이상, 여자는 1.4mg/dL 이상인, 또는 크레아티닌 청소율이 비정상인) 환자분
- 2) 약물치료가 필요한 울혈성 심부전 환자분
- 3) 방사선 요도 조영물질을 정맥내 투여하는 검사(예 : 정맥요조영술, 정맥담관조영술, 혈관조영술, 조영제를 사용한 컴퓨터단층촬영술 등)를 받는 환자분(급성신부전을 일으킬 수 있고, 이 약을 투여 받는 환자분에서는 유산산증과 관련이 있습니다. 따라서 이러한 검사가 계획된 환자분에서는 이 약을 적어도 투여 48시간 전에 중지해야 하고, 48시간 이후에 신기능을 재평가하고 정상으로 판명된 이후에만 치료를 재개합니다.)
- 4) 이 약의 성분 또는 비구아니드계 약물에 과민반응의 병력이 있는 환자분
- 5) 제 1형 당뇨병, 혼수를 수반하거나 그렇지 않은 당뇨병케톤산증을 포함하는 급성 또는 만성 대사산증 환자분 및 케톤산증의 병력이 있는 환자분[제 1형 당뇨병과 당뇨병케톤산증은 인슐린으로 치료합니다.]
- 6) 중증 감염증 또는 중증의 외상성 전신장애 환자분에서는 이 약의 치료는 일시적으로 중지되어야 하고 환자분의 경구적 섭취가 회복되고 신기능이 정상으로 판명될 때 치료를 다시 시작해야 합니다.
- 7) 수술 과정의 경우(음식과 수액의 섭취에 제한이 없는 가벼운 수술은 제외) 이 약은 수술 48시간 전에 일시적으로 중지되어야 하고, 최소 48시간이 지난 후 신기능이 정상이라고 판명된 후에 치료를 다시 시작해야 합니다.
- 8) 영양불량상태, 기아상태, 쇠약상태, 뇌하수체기능부전 또는 부신기능부전환자분
- 9) 간기능 장애(손상된 간 기능은 유산산증의 몇몇 경우와 관련이 있기 때문에, 일반적으로 임상적 또는 실험실적으로 간 질환의 증거가 있는 환자분에게는 이 약의 투여를 피해야 합니다.), 폐경색, 중증의 폐기능장애 환자분 및 기타 저산소혈증을 수반하기 쉬운 상태, 과도한 알코올 섭취자, 탈수증, 설사, 구토 등의 위장장애 환자분
- 10) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부

3. 다음 환자분에는 신중히 투여하십시오. (유산산증과 저혈당의 가능성이 있습니다.)

- 1) 불규칙한 식사섭취, 식사 섭취량의 부족

- 2) 격렬한 근육운동
- 3) 상호작용이 있는 약물을 투여하는 환자분

4. 이상반응

사만 후 조사와 임상시험 결과에서 이 약을 투여받은 환자분에게서 보고된 부작용은 그 내용과 정도에 있어서 염산메트포르민 즉시 방출형 정제를 투여받은 환자분에게서 보고된 부작용과 비슷했습니다. 다음과 같은 부작용이 이 약을 투여받을 때 나타날 수 있습니다. 빈도는 다음과 같이 정의됩니다.

매우 일반적: $>1/10$ 일반적: $>1/100$, $<1/10$ 일반적이지 않음: $>1/1,000$, $<1/100$ 드물: $>1/10,000$, $<1/1,000$ 매우 드물: $<1/10,000$ 및 개별적인 증례

1) 대사와 영양 장애

매우 드물: 메트포르민의 장기간 투여 시 비타민 B12의 흡수 및 혈장 레빈의 감소. 이러한 변화는 일반적으로 임상적 유의성 없이 나타납니다.

매우 드물: 유산산증 (유산산증은 드물기는 하나 심각하며, 치료기간 중 염산메트포르민이 축적되어 나타나는 대사성 합병증입니다. 발생한 경우에서 있어서는 50%가 치명적입니다). 유산산증은 조직의 유익한 관류저하와 저산소증이 있을 때, 당뇨병을 포함하는 병리생리학적 상태와 결부되어 나타날 수 있습니다. 유산산증은 혈중 젖산 농도 증가(5mmol/L 초과), 혈중 락타이드, 음이온 간의 차이가 늘어나는 전해질 불균형과 젖산/피루브산염의 비가 증가하는 것을 특징으로 합니다. 염산메트포르민이 유산산증의 원인이라고 여겨지는 경우, 염산메트포르민의 혈중농도는 일반적으로 5μg/mL을 초과하는 것으로 나타납니다. 염산메트포르민을 투여 받은 환자분에서 있어서 유산산증의 발현에 대한 보고는 매우 적습니다(연간 환자 1,000명당 약 0.03건, 치명적인 경우는 연간 환자 1,000명당 약 0.015건). 보고된 경우는 주로 많은 내·외과적인 문제가 병합된 경우와 많은 약물의 복합투여 등의 상태에서, 내인성 신장질환과 신장 관류저하를 포함하는 신기능이 유의하게 저하된 당뇨병 환자분에서 일차적으로 발생된 것입니다. 유산산증의 위험은 신기능 저하의 정도와 환자분의 나이에 따라 증가됩니다. 따라서 유산산증의 위험은 염산메트포르민을 투여하는 환자분의 신기능을 정기적으로 모니터링하고, 최저 유효량을 투여함으로써 유의적으로 저하될 수 있습니다. 덧붙여 염산메트포르민은 저산소증, 탈수, 패혈증과 관계된 증상이 나타날 경우 즉각 투여를 중지해야 합니다. 간기능이 손상된 경우 젖산 배설능력이 유의적으로 저하될 수 있으므로, 일반적으로 간질환의 임상적 또는 실험실적 소견이 있는 환자분의 경우 염산메트포르민을 투여하지 않습니다. 알코올은 염산메트포르민이 젖산대사에 영향을 미치게 할 가능성이 있으므로, 염산메트포르민을 투여 받는 동안 급·만성적인 알코올의 과량섭취는 피해야 합니다. 또한, 혈관 내 방사선 조영제 검사나 수술 전에는 염산메트포르민을 투여를 일시적으로 중지해야 합니다. 유산산증의 시작은 때때로 구별이 어렵고 견대, 근육통, 호흡곤란, 심해지는 졸음과 복부 통증과 같은 비특이적 증상들을 수반합니다. 산증이 더 심해질 경우 체온저하, 저혈압과 저혈당 서맥부정맥이 나타날 수 있습니다. 환자분과 의사는 이러한 증상들의 중요성에 대해 알고 있어야 하며, 환자분은 만약 이러한 증상이 나타나는 경우 의사에게 즉시 알려야 합니다. 혈청 전해질, 케톤, 혈당, 혈중 pH, 젖산농도와 염산메트포르민의 혈중 농도도 유산산증을 확인하는데 유용할 수 있습니다. 또한, 유산산증의 의심이 큰 경우에는 젖산의 측정결과를 기대할 것 없이 필요한 처치를 합니다. 특히, 투여 개시 초기 투여량을 증가한 경우에는 유산산증이 발생하기 쉬우므로 주의합니다. 치료 초기에 환자분이 염산메트포르민의 특정 용량에서 안정화되면 흔히 위장관 증상이 나타날 수 있으나, 후기에 나타나는 위장관 증상은 유산산증이나 다른 심각한 질병 때문일 수 있습니다. 염산메트포르민을 투여 받은 환자분의 공복 시 경맥 혈당의 젖산 농도가 정상 상한치 이상이지만 5mmol/L 이하인 경우, 유산산증이 임박했다는 것을 나타내지 않으며, 잘 조절되지 않은 당뇨병이나 비만, 지나친 육체활동 또는 감제를 다루는데 있어 기술적인 문제와 같은 다른 기전에 기인할 수 있습니다. 유산산증은 케톤산증(케톤농도와 케톤혈청)의 증거가 없는 대사성 산증이 나타나는 당뇨병환자분에서 의심해야 합니다. 유산산증은 입원치료를 요하는 내과적 응급상황입니다. 염산메트포르민을 투여한 환자분에서 유산산증이 일어난 경우, 약물을 즉시 투여 중지하고 즉각 일반적인 보조요법을 실시해야 합니다. 염산메트포르민은 투석이 가능하기 때문에(양호한 혈액학적 조건에서 170mL/분에 이르는 청소율), 산증을 정상화하고 축적된 약물을 제거하기 위해 즉각적인 혈액 투석이 추천됩니다. 이러한 처치는 때때로 즉각적인 증상 호전과 회복을 가져옵니다.

2) 신경계 장애

일반적: 근육성 입맛

3) 위장관 장애

매우 일반적: 오심, 구토, 설사, 복통 및 식욕부진과 같은 위장관 장애

이러한 부작용은 치료의 초기에 가장 빈번히 발생하여 대부분의 경우 자연적으로 사라집니다. 용량을 점진적으로 증가시키는 것이 위장관 내약성을 증가시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 치료초기 동안 위장관 증상은 용량과 관련하여 발생되기 때문에 용량을 점진적으로 증가시키거나, 염산메트포르민을 식사와 함께 투여함으로써 감소시킬 수 있습니다. 심각한 설사 그리고/또는 구토는 탈수와 신전 질소혈증을 일으킬 수 있으므로, 이런 증례에서는 일시적으로 중지해야 합니다. 염산메트포르민에 안정화가 이루어진 환자분의 경우, 비특이적인 위장관계 증상은 치료에 기인한 것이 아니라 병발한 질병이나 유산산증의 가능성이 있습니다.

4) 간 및 담도 장애

개별적인 증례: 메트포르민 투여를 중단하자 간기능검사 이상 및 간염이 호전되었습니다.

5) 피부 및 피하조직 장애

매우 드물: 몇몇의 민감한 환자분에서 있어서 가벼운 홍반. 이러한 경우 투여를 중단합니다.

5. 일반적 주의

- 1) 신 기능에 대한 모니터링: 이 약은 신장으로 대부분 배설 되고, 이 약의 축적과 유산산증의 위험은 신기능의 장애 정도에 따라 증가됩니다. 따라서, 나이에 따른 정상 상한치 이상의 혈청 크레아티닌값을 갖는 환자분은 이 약을 투여하면 안됩니다. 고령자에 있어 노화는 신기능 저하와 관련이 있기 때문에 주의하여 적절한 혈당 조절 효과를 얻는 최소용량을 설정해야만 합니다. 고령자는 정기적으로 신기능을 모니터링해야 하고, 일반적으로, 최대 용량으로 설정하지 않습니다. 이 약은 치료 시작 전과 그 후 적어도 1회는 신기능 검사를 하여 정상인지 확인하여야 합니다. 신기능 부전의 발현이 예상되는 환자분은 신기능을 좀 더 자주 평가하고 신기능 부전의 징후가 있을 때에는 이 약의 투여를 중지합니다.
- 2) 당뇨병 유사증상: 당뇨병의 진단이 확립된 환자분에 대하여만 적용을 고려합니다. 당뇨병 이외에도 내당능 이상, 요당양상 등 당뇨병 유사증상(신성 당뇨, 노인성 당뇨, 대사 이상, 갑상선 기능 이상 등)을 가진 질환이 있는 것에 유의합니다.
- 3) 투여 중의 조절: 투여 중에 투여가 필요 없게 된 경우나, 강량이 필요한 경우 또는 환자분의 약화, 감염증의 합병 등에 의해 효과가 없게 되거나 불충분하게 된 경우가 있으므로, 식사 섭취량, 체중변화의 추이, 혈당치, 감염증의 유무 등에 유의하여 투여 지속의 여부, 투여량, 약제의 선택 등에 유의합니다.
- 4) 저산소증 상태: 어떤 원인에 의한 심혈관계 허탈(탈수), 급성 울혈성심부전, 급성 심근경색과 저산소증으로 특징지을 수 있는 다른 조건은 유산산증과 연관되어 있으며 신전 질소혈증을 일으킬 수 있습니다. 이 약의 치료를 받는 환자분에서 이러한 일이 일어난다면, 이 약의 투여를 즉시 중지해야 합니다.
- 5) 알코올 섭취: 알코올은 젖산 대사에 대해 이 약이 미치는 영향을 증대시켜 유산산증의 위험이 증가된다고 알려져 있습니다. 따라서 이 약을 투여하는 동안 급성 또는 만성적인 알코올의 과량섭취는 피해야 합니다. 특히 질식 또는 영양상태가 좋지 않은 경우 및 간 기능이 정상적이지 않은 경우, 알코올의 섭취를 삼가야 합니다.

- 6) 비타민B₁₂: 29주 동안 지속된 임상시험에서 염산메트포르민을 투여받은 환자분의 약 7%에서, 임상적 증후 없이, 시험 전에 정상 혈청 비타민 B₁₂ 수치가 정상 이하로 감소하는 것으로 관찰되었습니다. 그러나 이러한 감소는 B₁₂-내부인자 복합체로부터 B₁₂ 흡수를 방해하기 때문에 가능하고, 빈혈과의 연관성은 거의 없으며, 염산메트포르민의 투여 중지나 비타민 B₁₂를 보충함으로써 빠르게 회복됩니다. 염산메트포르민을 투여 받은 환자분은 매년 혈액학적 수치들을 검사해야 하며, 명백한 비정상성은 적절히 평가되고 관리되어야 합니다. 특정 개인(비타민 B₁₂나 칼슘 섭취 혹은 흡수가 부적절한 사람들)은 정상 이하로 비타민 B₁₂ 값이 감소할 소인이 있습니다. 이러한 환자분은 2 ~ 3년 간격으로 정기적인 혈청 비타민 B₁₂ 측정을 하는 것이 유용할 수 있습니다.
- 7) 조절된 당뇨병환자의 변화: 전에 이 약으로 제 2형 당뇨병이 잘 조절되었던 환자분에서 실험실적 비정상 소견이나 임상적 질환 (특히, 모호하며 잘 정의되지 않는 질환)이 발견되면, 즉시 케토산증이나 유산산증의 발현에 대해 평가해야 합니다. 혈청 전해질, 케톤, 혈당에 대해 검사하고, 필요하다면, 혈중 pH, 젓산, 피루브산염과 염산메트포르민의 농도에 대해서도 검사합니다. 만약 어떠한 형태라도 산증이 나타났다면, 염산메트포르민의 투여를 즉시 중지하고, 다른 적절하고 올바른 조치를 취합니다.
- 8) 저혈당: 저혈당은 일반적인 사용 환경 하에서 염산메트포르민을 단독 투여한 환자분에서는 나타나지 않으나, 열량 섭취가 불충분한 경우, 격렬한 운동이 열량 섭취로 보충되지 못한 경우나 다른 혈당강제제(설펜소, 인슐린 등) 또는 알코올을 병용 투여하는 경우에 발생합니다. 특히 고령자, 쇠약하거나 영양 불균형인 환자분, 부신이나 뇌하수체 부전 환자분 또는 알코올을 중독자인 경우 저혈당이 나타나기 쉽습니다. 저혈당은 고령자, β-아도레날린 차단 약물을 투여하는 사람에서는 식별하기 어려울 수 있습니다. 염산메트포르민의 투여에 의해 저혈당 증상이 인정되는 경우에는 저혈당은 당뇨병에 대한 일반적인 설명(자당)을 투여하며, α-글루코시다제 저해제(아카보즈, 보글리보스)와 병용에 의해 저혈당 증상이 인정되는 경우에는 포도당을 투여합니다.
- 9) 혈당조절의 실패: 어떤 당뇨병 치료법으로 안정화된 환자분이 발열, 경련, 감염 또는 수술과 같은 스트레스에 노출되면 일시적으로 혈당조절에 실패할 수 있습니다. 이러한 시기에는 염산메트포르민을 투여 중지하고, 일시적인 인슐린 투여가 요구될 수 있습니다. 염산메트포르민은 급성 위기 상태가 소실된 후 투여를 재개할 수 있습니다. 일정 수준으로 혈당을 저하시키는 경우 혈당강제제의 효과는 많은 환자분에게 있어 일정 기간 후에는 저하됩니다. 질환의 진행이나 약물에 대한 반응 감소 때문에 일어나는 이러한 현상은 2차 실패로 알려져 있고, 초기 치료 기간동안 약물이 효과가 없는 1차 실패와는 구별됩니다. 염산메트포르민과 설펜소 요법으로 2차적 실패가 되었다면, 인슐린 요법을 시작하는 것이 필요할 수 있습니다.
- 10) 특정 직업의 환자분: 드물게 심한 유산산증, 중증의 자연성 저혈당을 일으킬 수 있으므로, 고소(高所)직업, 자동차 운전 등에 종사하고 있는 환자분에 투여할 경우에는 주의합니다. 또한 유산산증 및 저혈당에 대한 주의에 대하여 환자분 및 그 가족에게 충분히 경고하고 철저히 주의시킵니다.
- 11) 환자분들에게 염산메트포르민과 다른 치료방법의 잠재적 유익성과 위험성에 대해 알려야 합니다. 또한, 식사요법의 지속, 규칙적인 운동 계획, 정기적인 혈당검사, 당화 혈색소, 신기능과 혈액학적 수치에 대한 검사의 중요성에 대해 알려야 합니다. 유산산증의 위험, 그것의 증상과 발현될 수 있는 소인에 대해 환자분에게 설명하여야 합니다. 만약 설명할 수 없는 과호흡증, 근육통, 공포, 피로, 비정상적인 의식혼미, 또는 다른 불특정적인 증상이 나타나면, 즉시 염산메트포르민을 중지하고 의뢰인에게 알리도록 하여야 합니다. 환자분에게 염산메트포르민을 투여하는 동안 급성인든 만성인든 과다한 알코올을 섭취의 위험에 대해 조언해야 합니다. 염산메트포르민과 경구용 설펜소와 병용 시 저혈당을 일으킬 수 있지만, 염산메트포르민 단독으로는 보통 급성 저혈당을 일으키지 않습니다. 병용요법의 초기에 저혈당의 위험, 증상과 치료, 그리고 발현될 수 있는 조건에 대해 환자분에게 설명하여야 합니다.
- 12) 경구혈당강제제의 투여는 식사 단독 요법이나 식사와 인슐린의 병용 치료와 비교하여 심혈관계 사망률의 증가와 관련 있다고 보고 된 바 있습니다. 이러한 경고는 제 2형 당뇨병인 환자분에서 혈당 저하 약물이 혈관계 합병증을 예방하거나 지연시키는 효과를 평가하기 위해 University Group Diabetes Program(UGDP)에서 수행된 연구에 기초합니다. 5~8년 동안 식사요법과 규정된 양의 툴부타미드(15g/day) 또는 식사요법과 규정된 용량의 펜툴라민(100mg/day)을 투여받은 환자분은 심혈관계 사망률이 식사요법만을 실시한 환자분의 약 25배라고 UGDP는 보고하였으며, 이 두 투여군의 투여중지라는 결과를 가져왔습니다. 이러한 결과 해석에 대한 반대 의견이 있음에도 불구하고, UGDP 연구의 결과는 이러한 경고에 대한 합당한 기초를 제공합니다. 환자분에게 염산메트포르민과 다른 형태의 치료의 잠재적 유익성과 위험성에 대해 주지시켜야 합니다. 이 연구에서는 설펜소계 중 하나의 약물(툴부타미드)과 비아나이드계 중 하나(펜툴라민)만 포함되어 있지만, 각 계열의 약물 중 작용기전과 화학적 구조의 유사성이라는 측면에서, 이러한 경고를 관련된 다른 혈당강제제에도 적용할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.
- 13) 모든 당뇨병 치료의 반응은 정상적인 범위로 수치를 강하시킬 목적으로 공복 시 혈당과 당화 혈색소 수치를 정기적으로 측정하여 모니터링 해야 합니다. 용량 결정 초기에는 공복 시 혈당을 치료 반응을 결정하는데 사용할 수 있습니다. 따라서 혈당과 당화 혈색소 모두 모니터링 되어야 합니다. 당화 혈색소치는 장기간 조절을 평가하는데 특히 유용합니다.
- 14) 초기와 정기적인 혈액학적 수치(예를 들어 헤모글로빈/헤마토크릿, 적혈구지수와 신기능(혈청 크레아티닌)의 모니터링은 최소 1년을 기준으로 행해져야 합니다. 염산메트포르민으로 치료 중 거대적혈모구성 빈혈이 드물게 관찰되며, 의심 된다면 비타민 B₁₂ 결핍 가능성을 확인해야 합니다.
- 15) 이 약은 부수거나 씹어먹지 말고 전체를 삼켜야 하며, 정제의 겔질이 대변을 통해 나올 수 있으므로, 환자분들에게 이것이 정상임을 미리 알려야 합니다.

6. 상호작용

- 1) 다음 약제와 병용에 의해 혈당강화 작용이 증가 또는 감소될 수 있으므로 병용하는 경우에는 혈당치 및 다른 환자분의 상태를 충분히 관찰하면서 투여합니다.
- 혈당강화 작용을 증가시키는 약제
 - 인슐린제제, 설폰닐아미드계 및 설펜소계 약제, 알파-글루코시다제 저해제(알릴포스), 단백동화스테로이드, 구아니티딘, 살리실산제(아스피린등), β-차단제(프로프라놀롤등), MAO 저해제, 안지오텐신 전환 효소 억제제
 - 혈당강화 작용을 감소시키는 약제
 - 에피네프린, 교감신경약, 코르티코스테로이드, 갑상선호르몬, 난포호르몬, 에스트로겐, 경구용피임약, 치아질과 기타 아노제, 피라진아미드, 이소니아지, 니코틴산, 페노치아진계 약제, 페니토인, 칼슘채널길항제
- 2) 글리부라이드: 제 2형 당뇨병인 환자분에 대한 단회투여 연구에서 염산메트포르민과 글리부라이드의 병용 투여는 염산메트포르민의 약물 동력학적 또는 약물 동태학적 특성에 변화를 일으키지 않았습니다. 글리부라이드의 AUC와 C_{max}가 감소하는 것이 관찰되었으나, 편차가 큼니다. 이 연구에서 단회투여와 염산메트포르민의 혈당 농도와 약물 동태학적 효과간의 상관관계가 없는 것은 이런 상호 작용의 임상적 유의성이 불명확하다는 것을 나타냅니다.
- 3) 혈중 지질: 건강한 사람에서 단회투여로 염산메트포르민과 푸로세미드의 약물상호작용에 대한 연구는, 병용투여에 의해 각 물질의 약물동력학적 수치들이 영향을 받는다는 것을 나타냈습니다. 푸로세미드는 염산메트포르민의 신장 청소율의 유의적인 변화 없이 염산메트포르민의 혈장농도를 증가시키며, 혈중 C_{max}를 22%, 혈중 AUC를 15% 상승시킵니다. 염산메트포르민과 함께 투여했을 때, 단일 투여에 비해 푸로세미드의 C_{max}와 AUC가 각각 31%와 12% 감소되었으며, 푸로세미드의 신장 청소율의 변화 없이 최종 반감기를 32% 감소시킵니다. 만성적으로 염산메트포르민과 푸로세미드를 병용투여 하였을 때 상호작용에 관한 유용한 정보는 없습니다.

- 4) 니페디핀 : 정상인 건강한 자원자에서 단회투여로 염산메트포르민과 니페디핀의 약물상호작용에 대한 연구는, 니페디핀과의 병용 투여가 혈장 내 염산메트포르민의 C_{max} 와 AUC를 각각 20%와 9% 증가시키며, 요중 배설을 증가시킵니다. T_{max} 와 반감기는 영향이 없습니다. 니페디핀은 염산메트포르민의 흡수를 촉진시킵니다. 염산메트포르민은 니페디핀에 영향을 크게 미치지 않습니다.
- 5) 신기능에 영향을 미칠 수 있거나 유의한 혈액학적 변화를 야기하거나 신세뇨관 분비로서 배설되는 양이온 약물과 같이 염산메트포르민에 영향을 미칠 수 있는 약물 : 이론적으로 신장 세뇨관 분비로서 배설되는 양이온성 약물을 들어 아미노글라이코사이드, 디곡신, 모르핀, 프로카인아미드, 퀴니딘, 퀴닌, 라니티딘, 트리암테렌, 트리메토프림과 빈코마이신은 일반적인 신장 세뇨관 이동체에 대한 경쟁으로써 염산메트포르민과 작용할 가능성이 있습니다. 정상인 자원자에 대한 단회 및 다회 투여 시에서 관찰된 염산메트포르민과 시메티딘 간의 상호작용에 대한 연구는 염산메트포르민의 최대 혈장농도와 전체 혈장농도를 60% 상승시키고, 혈장과 전혈중의 염산메트포르민 AUC를 40% 증가시킵니다. 단회 투여 시 배설 반감기에는 변화가 없었습니다. 염산메트포르민은 시메티딘의 약물 동력학에는 아무런 영향도 끼치지 않았습니다. 이러한 약물 상호작용이 이론적으로는 가능하나(시메티딘은 제외), 근위 세뇨관 분비계를 통해 배설되는 양이온성 약물을 투여받는 환자분은, 자제 한 모니터링과 염산메트포르민과/또는 상호작용이 있는 약물의 용량조절이 추천됩니다.
- 6) 기타 : 건강한 자원자에 대한 단회 병용 투여 연구에서, 염산메트포르민과 프로프라놀롤, 염산메트포르민과 이부프로펜의 약물동력학적 성질은 서로 영향을 받지 않습니다. 염산메트포르민이 혈장 단백질과 결합하는 것은 무시해도 좋을 정도이므로, 혈장 단백질과 광범위하게 결합하는 실험요소와 비교할 때, 살리실산, 실폴아미드, 클로람페니콜과 프로베네시드와 같이 단백질과 다량 결합하는 약물과는 상호작용이 적습니다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 임부에 대한 투여 : 임부 또는 임신 하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않습니다.(동물실험에서 기형형성 작용에 대한 보고가 있으며 임부에게는 유산산 증이 일어나기 쉽습니다.)최근의 연구에서 임신 기간 동안 비정상적인 혈당 농도가 선천성 기형의 높은 발현과 관련이 있다는 보고가 있으므로, 가능한 정상에 가까운 혈당을 유지하기 위해 임신기간 동안 인슐린을 사용하는 것이 전문가들 사이의 공통된 견해입니다.
- 2) 수유부에 대한 투여 : 수유중인 랫드에서 메트포르민은 유즙으로 분비되는 것으로 보고되었으므로 수유부에는 투여하지 않습니다.
8. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성과 유효성은 확립되지 않았으므로 17세 미만의 소아에게 투여는 권장되지 않습니다. 어린이의 성숙시기에 나타나는 당뇨병(MODY)에 대해 행해진 연구는 없습니다.
9. 고령자에 대한 투여 : 고령자의 신기능감소와 관련하여 염산메트포르민의 용량은 환자분의 신기능에 근거하여 용량이 조절되어야 하고, 정기적인 신기능모니터링이 필요합니다. 염산메트포르민은 대부분 신장으로 배설된다고 알려져 있으며, 부적절한 신기능을 갖는 환자분에서는 심각한 약물 부작용의 위험이 있기 때문에, 정상적인 신기능을 가진 환자분에게만 사용하도록 합니다.
10. 과량투여시의 처치 : 염산메트포르민을 85g까지 투여하여도, 이러한 상태에서 유산산증이 일어나더라도 저혈당이 유발되지는 않습니다. 이 약은 양호한 혈액학적 조건에서 170mL/분에 이르는 청소율로 투석됩니다. 따라서 이 약의 과량투여가 의심되는 환자분에서 축적된 약물을 제거하기 위해 혈액 투석은 유용할 수 있습니다.
11. 기타
- 1) 이 약은 1차적 또는 2차적으로 재생성되는 약물이나 탐닉으로 야기시키는 약물동태학적 성질을 나타내지 않습니다.
- 2) 장기간 발암성시험이 랫트(용량 104주 지속)와 마우스(9주 지속)에 대해 각각 900mg/Kg/day와 1500mg/Kg/day의 용량으로 실시되었습니다. 이러한 용량은 체표면적에 기초한 인체의 1일 최대 허용량의 약 3배입니다. 암 · 수 마우스 모두에서 이 약과 관련된 발암성의 증거는 없었습니다. 유사하게 수컷 랫드에서 이 약에 의한 종양 유발가능성은 없었습니다. 그러나 900mg/Kg/day로 투여한 암컷 랫드에서 양성 간질성 지공 증종이 증가하는 것이 관찰되었습니다. 복귀돌연변이시험(S. typhimurium), 유전자 돌연변이시험(마우스 림프종 세포), 염색체 이상시험(인 림프구) 또는 생체 내 소핵 시험(마우스 골수세포)에서 이 약의 변이원성 가능성에 대한 증거는 없었습니다. 암 · 수 랫드의 수태능은 600mg/Kg/day의 고용량, 또는 체표면적을 기준으로 최대 허용량의 약 2배를 투여했을 때 이 약에 의해 영향을 받지 않았습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관($1\sim 30^{\circ}\text{C}$) 하십시오.

【포장단위】 제조원 포장단위입니다.

【사용기간】 제조일로부터 36개월입니다. (외부용기에 별도기재)

수 입 자 : (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

제조의회사 : Merck Serono Ltd, Bedford Cross, Stanwell Road, Feltham, Middlesex, TW14 8NX, United Kingdom

제 조 자 : Merck KGaA Frankfurter Straße 250, Darmstadt, D-64293, Germany

Merck Santé s.a.s, Centre de production de Semoy, 2 rue du Pressoir Vert, 45400, France

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 첨부서 최종 개정연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

(주)대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

Trademarks under license from
MERCK

작성년월일 : 2010.03.18
최종개정년월일 : 2012.08.17