

폴산결핍증의 예방 및 치료

폴원 연질캡슐
folone

【원료약품 및 그 분량】1캡슐(575mg) 중

폴산(KP).....1.0mg

첨가제(천연색소) : 락색소

【성상】

황색 또는 옅은 주황색의 내용물을 함유한 적색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 폴산결핍증의 예방 및 치료
2. 폴산의 수요가 증가하여 식사로부터 섭취가 불충분한 경우의 보급 소모성 질환, 임부·수유부
3. 악성빈혈의 보조요법(비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 빈혈 제외)
4. 다음 질환 중 폴산의 결핍 또는 대사장애가 관련한다고 추정되는 경우
 - 1) 영양결핍성빈혈, 임신성빈혈, 소아빈혈
 - 2) 항진균제, 항말라리아제 투여로 인한 빈혈
5. 알콜중독 및 간질환에 관련된 거대적아구성빈혈

【용법·용량】

1. 폴산결핍증, 다른 약물 투여로 인한 결핍증 치료
성인: 폴산으로서 1일 1mg을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
 - 2) 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 악성빈혈 또는 거대적아구성빈혈
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 악성빈혈 환자(투여 시, 혈액상태는 개선되나 신경증상에는 효과가 없으므로 비타민 B₁₂ 제제를 병용할 것. 단, 진단이 확립되지 않는 악성빈혈 환자의 경우 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하여 진단 및 치료에 영향을 줄 수 있으므로 주의할 것.)
 - 3) 아미노살리실산, 경구용 피임제, 디하이드로폴레이트 환원효소 저해제(메토트렉세이트, 트리메토프림 등을 복용 중인 환자(바람직하지 않는 상호작용을 초래할 수 있다.)
 - 4) 페니토인 같은 히단토인계 항진균제를 복용 중인 환자(페니토인의 혈중농도를 감소시켜 발작빈도를 증가시킬 수 있다.)
 - 5) 설파살리진, 콜레스티라민을 복용 중인 환자(이 약의 위장관 흡수를 저해할 수 있다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 흥분(불은반점), 피부발진, 가려움증, 전신권태, 호흡곤란 등의 알레르기 증상
- 2) 식욕부진, 구역·구토, 부종(부기), 체중감소
- 3) 위장관장애, 수면변화, 집중부족, 과잉행동, 과민성, 흥분, 우울증, 혼란, 판단력 장애 등의 중추신경장애(고용량(일 15 mg 이상)에서 나타날 수 있다.)

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용), 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【포장단위】 30캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

-
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
 - 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 - 설명서 작성일자(2011년 01월) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.
 - 소비자상담실: 02-568-0051
-

작성일: 2011. 01

【판매원】



광동제약(주)

경기도 평택시 모곡동 440-2

【제조원】



경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6

알엔피코리아(주)