

로알비타 연질캡슐

■ 원료약품 및 그 분량 : 1캡슐 중

로알젤리(KPC).....	20mg
(10-히도릭산-2-데케노인산으로서 0.8mg)	
토코페롤이세이트(KP).....	50mg
(비타민E로서 50IU)	
아스코르브산(KP).....	100mg
티아민염산염(KP).....	10mg
리보플라빈(KP).....	2mg
파리독신염산염(KP).....	5mg
시아노코발라민(KP).....	0.012mg
니코틴아마이드(KP).....	40mg

부형제 : 건조난백분말 (별규)
첨가제 : 식약청인정타르색소 (적색40호, 청색호, 황색203호, 황색5호)
동물유래성분 : 건조난백분말 (계란, 난백)

■ 성상 : 황갈색의 유상물이 든 양면 적갈색의 연질캡슐제

■ 효능·효과 :

다음 경우의 비타민B₁, B₂, B₆, C, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기

이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 말초혈행장애 및 경련기시 다음 증상의 완화 : 어께·목결림, 수족냉증·손발이 차가움

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨결림) 등)

- 각기

- 눈의 피로

■ 용법·용량 : 성인 및 8세이상 어린이 : 1일 3회, 1회 1캡슐씩 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자

2) 3개월 미만의 영아

3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 과수산노증환자 (hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

3) 임부, 수유부

4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 이상반응

1) 이 약 투여에 의하여 위부 불쾌감, 변비, 발진, 발적(종혈)이 나타나지, 구역, 구토, 설사, 묽은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.

3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

5) 파킨슨을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애) 또는 병적 변화가 나타날 수 있습니다.

6) 폴락세민이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10mg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.

7) 과당류 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여합니다.

3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

4) 복용 시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용합니다.

5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 레보도파 함유 약물과 병용 투여하지 않습니다.

6. 임상검사에의 영향

1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

2) 요를 황색으로 변화시켜 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장시의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉투병을 꼭 단아하여 보관합니다.

3) 오용(잘못사용) : 남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 제조원 : (주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상산리 901-3

■ 판매원 : 한미메디케어(주) 서울시 송파구 방이동 48-9

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 의하여 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 작성일(2010년 06월 10일) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr) 또는 소비자상담실(전화번호080-612-8660수신자부담)로 문의하시면 확인할 수 있습니다.