

하드코프 캡슐

분류번호 : 222

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(180mg) 중

말레인산카르비노사민(USP)	2.0mg
d-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	10.0mg
노스카핀(KP)	10.0mg
구아아콜설폰산칼륨(KP)	45.0mg

【성상】 흰색 가루가 들어있는 상부 암록색, 하부 미황색의 경질캡슐제

【효능·효과】 기침, 가래

【용법·용량】 성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 가지고 있는 환자
 - 약으로 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 간장애, 신장애, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열환자, 허약자
 - 심장에 및 고혈압 환자, 고령자
 - 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함등)환자, 배뇨장애 환자
 - 수유부
 - 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 부작용
 - 이 약을 투여하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 상호작용

다음 약물과 병용하지 않는다.

다른 진해거담제(기침가래약), 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등
- 소아에 대한 투여
 - 7세 이하의 영유아에는 시험제를 투여한다.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1-30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

*사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

*첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

*의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

☎ 소비자상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)