

육체피로 · 체력 저하시 · 비타민보급 헬시민큐 연질캡슐

원료약품 및 분량 : 1캡슐 중

니코틴산아미드(KP).....	20mg
리보플라빈(KP).....	3mg
아스코르브산(KP).....	60mg
티아민염산염(KP).....	2mg
레티놀팔미테이트(KP).....	5,000IU
토코페롤아세테이트(KP).....	10mg
(비타민E로서 10IU)	
피리독신염산염(KP).....	3mg

성상 : 황갈색의 내용물이 충전된 암적갈색의 장방형 연질캡슐

효능 · 효과 :

다음 경우의 비타민A, B1, B2, B6, C, E의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후의 체력 저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

: 눈의 건조감의 완화, 야맹증

용법 · 용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용합니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

▶ 육체피로 ▶임신 · 수유기 ▶노년기
▶병중 · 병후의 체력 저하시

※ 최신의약품 정보 : 이지드럭 (ezdrug.kfda.go.kr) 참조

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 · 환불 받을 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 작성일(2010년 12월 20일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)의 또는 소비자상담실(전화번호 : 080-612-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.

 주식회사 **동구제약**

경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3

제조번호 : 101204

사용기한 : 2013. 12. 16



분리배출

육체피로 · 체력 저하시 · 비타민보급

헬시민큐

사용상의 주의사항

1. 경고 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)
 - 1) 1세 미만의 영아(갓난아기)
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산화이 배설되는 상태)
 - 4) 임부, 수유부
 - 5) 고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
4. 이상반응
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. : 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 설사, 붉은 변, 변비, 위부불쾌감, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구(복용)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증

(hyperurisemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다. - 레보도파

7. 임부에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(드러냄) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오용(잘못사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.