

일반의약품/분류번호 : 316

Hanmi

1캡슐

파워톤

연질캡슐

육체피로!!
체력저하시!!

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

니코틴산아미드(KP) 20mg / 리보플라빈(KP) 3mg / 아스코르브산(KP) 50mg
티아민염산염(KP) 2mg / 레티놀팔미타이트(KP) 5,000IU / 토포페콜아세테이트(KP)
10mg (비타민D로서 10IU) / 피리독신염산염(KP) 3mg

【성상】 황갈색의 내용물이 충전된 압적갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

- 1) 다음 경우의 비타민A, B₁, B₂, B₆, C, E의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력 저하시, 노년기
- 2) 이약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 눈의 건조감의 완화 - 야맹증

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

제조원 : (주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상산리 901-3


판매원 : 한미메디케어 서울시 송파구 방이 2동 48-9

※ 최신의약품 정보 : 이지드레(ezdrug.kidag.co.kr) 참조

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고지한 소비자
분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용
기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이
발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 작성일(2010년 7월 12일) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr) 또는 소비자상담실(전화번호 : 080-612-8890
수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.



(01)0880 6573 054 417

제조번호 : 100801

사용기한 : 2013. 08. 10

【사용상의 주의사항】

1. 경고 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 3개월 미만의 영아 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것) 1) 세 미만의 영아 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 4) 임부, 수유부 5) 고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 자질생 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 이상반응 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. - 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 땀은 변, 변비, 위부불쾌감, 발진, 발적 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다).

5. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다. 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체포배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼합되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호작용 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다. - 레보도파

7. 임부에 대한 투여 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A투여는 5,000IU/일 미만을 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

8. 임상검사치에의 영향 1) 각종 요검사에 해당의 검출을 방해할 수 있다. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

9. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다. 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.