



나푸롤 정
(나프로닐옥살산염)

ILDONG

전문 의약품

분류번호

217(혈관확장제)

원료약품의 분량 (1정중)

나프로닐옥살산염(KP) 100.0mg

첨가제(타르색소): 청색2호

성상 : 이 약은 밝은 파란색의 타원형 필름코팅정입니다. **IDP NF**

효능·효과 : 1. 뇌혈관 장애 2. 말초혈관 장애

용법·용량 : 성인 : 나프로닐옥살산염으로서 1회 100mg을 1일 3회 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 급성 심근경색 환자 2) 출혈성 상태 초기 환자 3) 기립성 조절장애 환자
- 4) 이 약에 과민증 환자
- 5) 고옥살산노 또는 재발성 칼슘 신장결석증의 병력이 있는 환자
- 6) 급성 심장마비 환자 7) 율혈성부전 환자 8) 중증의 심장 전도 결함 환자
- 9) 중증의 협심증 환자 10) 중증의 저혈압 환자 11) 간장애 환자
- 12) 발작을 일으킬 수 있는 환자
- 13) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 신장에 환자(중증의 신부전 환자 포함) 2) 관상동맥죽상경화증 환자

3. 이상반응

- 1) 정신신경계 : 뇌경련 발작, 감각이상, 때때로 불안, 졸음, 불면, 드물게 피로감, 두통, 어지럼 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 소화기계 : 식욕부진, 식도염, 구토, 때때로 구역, 위통, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 과민반응 : 두드러기, 혈관부종, 드물게 발진 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장 : 간염, 췌관염, 급성 간세포 괴사, 간효소 증가, 드물게 간부전이 나타날 수 있습니다.
- 5) 신장 : 배뇨장애, 옥살산 칼슘 신장결석이 나타날 수 있습니다.
- 6) 순환기계 : 혈압저하, 기립성 조절장애, 부정맥, 협심증, 실신, 말초 부종이 나타날 수 있습니다.
- 7) 기타 : 혈당 상승이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 고혈압 치료의 목적으로는 사용하지 않습니다.
- 2) 이 약의 복용은 옥살산칼슘 신장결석 형성을 일으킬 수 있으므로 충분한 배뇨량을 유지하기 위해 충분한 수분을 섭취합니다.
- 3) 이 약을 취침시에 음료없이 복용할 경우 국자성 식도염이 나타날 수 있습니다.

5. 상호작용

- 1) 혈압강화제와 병용 투여시 혈압강화작용이 증가될 수 있습니다.
- 2) 부정맥용제와 병용 투여시 부정맥용제의 작용이 증가될 수 있습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
- 2) 모유중으로의 이행이 보고되었으므로 수유중에는 투여하지 않습니다.

7. 과량투여시의 처리

과량투여에 의해 심전도역제 및 경련이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 위세척을 하고, 필요에 따라 활성탄을 사용합니다. 심혈관기능과 호흡을 모니터하며, 심한 경우 전기심박조율기를 사용하거나 이소프레날린을 투여합니다. 경련의 경우 디아제팜을 투여합니다.

저장방법 : 차광 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **포장단위** : 30정, 100정

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 11월 23일자로 작성되었으며, 이후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 : 서울시 서초구 바우뫼로27길 2
공장 : 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)

ILDONG