

비타민D, C 복합제

에드민정

콜레칼시페롤 · 아스코르브산

에드민정은 칼슘의 흡수에 관여하는 비타민D 중 체내흡수율이 좋은 비타민D₃와 유해산소로부터 세포를 보호하는 항산화작용을 가진 비타민C의 복합제입니다.

【성분 · 함량】 1정 중

콜레칼시페롤과립(KPC) 5mg

(비타민D로서 500IU)

아스코르브산(KP) 50mg

【성상】

연한 황색의 원형 필름코팅 정제

【효능 · 효과】

1. 다음의 경우 비타민D, C의 보급

- 1) 육체피로
- 2) 임신 · 수유기
- 3) 병중 · 병후의 체력저하시
- 4) 발육기
- 5) 노년기

2. 뼈 · 이의 발육불량

3. 구루병의 예방

【용법 · 용량】

8세 이상의 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 2회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 3개월 미만의 영아
- 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
- 4) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부·수유부

3. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 구역, 구토, 설사
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

6. 임상검사치에의 영향

각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

KGMP(우수 의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

【제조·판매원】 (주)한국피엠지제약 / 경기 시흥시 정왕동 시화공단 1라 603호

※ [최신 제품 정보 확인 방법] 이 첨부문서 작성일자(2010.09.02) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pmgpharm.co.kr)나 고객센터(031-475-5470)를 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 [이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→정보마당→의약품등 정보]를 참조하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 식품의약품안전청[이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→보고마당→안전성정보→의약품우해사례보고]에 알려하시기 바랍니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.



Pioneer Management Group

주식회사 한국피엠지제약

PMG PHARM Co., Ltd.