

안전한 말초성 진해제

리프로진 캡슐

(레보드로프로피진)

원료약품의 분량 : 1캡슐 중

레보드로프로피진(EP) 60mg

성 상 : 흰색의 분말이 충전된 상부 암보라색, 하부 흰색의 경질캡슐제

효능효과 : 기침 : 급 · 만성 기관지염

용법용량

성인 : 1회 1캡슐(레보드로프로피진으로서 60mg), 1일 3회 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 사용하지 말것

- 1) 이약에 과민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할것

- 1) 심각한 심부전 환자

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 현기증
- 3) 순화기계 : 두근거림
- 4) 피부 : 아주 드물게 알러지 반응이 나타날수 있다.

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나, 기계 조작시 주의할것

5. 임부 및 수유부예의 사용

임부및 임신 가능자, 수유부에는 투여하지 말것

6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 30℃이하 실온에서 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 30캡슐, 300캡슐

사용기간 : 제조일로부터 24개월

※ 이 설명서 작성개정 년 월 이 후 변경 된 내용은 홈페이지
(www.hawonpharm.co.kr)의제품정보를 통해 확인하십시오.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭
(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월 2010.12

제 조 자 : (주)일화

경기도 구리시 수택동 437

제조외뢰자 :



hawon제약

경기도 평택시 진위면 가곡리 543-3

<http://www.hawonpharm.co.kr>