

여성형·확산성·탈모 치료제

판시딜

캡슐

판시딜캡슐은 약용효모, 케라틴, 티아민질산염, 판토텐산칼슘, L-시스틴, 파라아미노벤조산의 6가지 성분이 배합되어 있어, 모발의 성장 및 건강에 필수적인 아미노산, 비타민 B군 등의 영양소를 혈액을 통해 모근 조직세포에 효과적으로 공급하므로, 확산성 탈모 및 손상된 모발에 효과를 나타냅니다. 또한 케라틴을 만드는데 필수적인 활성성분으로 구성되어 있어 손톱의 발육부진에도 효과를 나타냅니다.

원료약품 및 그 분량 1캡슐 중,

약용효모(별규)	100mg
케라틴(별규)	20mg
티아민질산염(EP)	60mg
판토텐산칼슘(USP)	60mg
L-시스틴(EP)	20mg
파라아미노벤조산(USP)	20mg

성상 연회색 가루의 내용물이 든 상부는 녹색 하부는 미황색의 불투명한 경질 캡슐제

효능, 효과 1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 확산성 탈모의 완화

용법, 용량 성안: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 복용
소아: 1일 1~2회, 1회 1캡슐 식후 복용

사용상의 주의사항

1. 부작용

드물게 위통, 구토 등 위장관 불편감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른 맥), 소양증(가려움증), 두드러기 등이 보고되었으며, 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타날 수 있다.

2. 일반적 주의

- 1) 설폰아미드제와 동시 복용 시 주의하여야 한다.
- 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로겐 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 않는다.
- 3) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우 의사와 상의한다.

3. 임부, 수유부에 대한 투여

임부, 수유부에 투여할 경우는 의사와 상의한다.

4. 적응상의 주의

- 1) 평균 치료 기간은 3~6개월이고 보통 약 3~4개월 후부터 효과를 나타내며 필요한 경우 투여를 계속하거나 반복 투여할 수 있다.
- 2) 본 제제는 당뇨병환자에 투여할 수도 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 않는다.
- 2) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

저장방법 차광기밀용기, 25℃이하 보관

포장단위 90캡슐

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품이며 공정거래위원회 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약㈜ 소비자 상담실 ☎080-777-5678: 수신자 요금 부담로 문의하여 주십시오.

제조사

동국제약

Dongkook

충청북도 진천군 평해원면 죽현리 488-5

설명서 최종 개정 연월일 : 2010. 9. 30