

덱시부시럽

DEXIBU Syrup (덱시부프로펜)

조제용
일반의약품
분류번호:114

【**원료약품의 분량**】 이 약 100ml 중

덱시부프로펜(KP)	1.20g
첨가제 (보존제):과라옥시벤조산페닐 (KP)	0.03g
첨가제 (보존제):과라옥시벤조산프로필 (KP)	0.02g
첨가제 (보존제):벤조산나트륨(KP)	0.045g

【**성상**】 흰색 불투명한 용액에 두 딸기향을 가진 흰색 내지 미황색의 시럽제

【**효능·효과**】 급성 상기도 감염으로 인한 발열시 해열

【**용법·용량**】

성후 6개월 이상의 소아 : 이 약은 1회 5~7mg/kg의 용량을 4-6시간 간격으로 필요시에 복용하며, 1일 최대 4회(280mg/kg)를 넘지 않는다. 체중이 30kg 이하인 소아에게는 1일 최대 25ml(덱시부프로펜으로서 300mg)를 초과하지 않는다. 급성상기도 감염으로 인한 소아 발열환자(액와/귀드랑이) 체온 38℃이상을 대상으로 이 약 5mg/kg, 7mg/kg를 투여한 임상시험(n=252)에서 이 약 5mg/kg 투여군보다 7mg/kg 투여군에서 더 큰 체온감소율을 나타내는 경향이 있었으나 통계학적으로 유의하지 않았다. 이 약 1회 용량은 몸무게 또는 나이에 따라 다음과 같이 투여할 수 있다. (몸무게를 아는 경우에는 몸무게에 따른 용량으로 복용하는 것이 더 적절하다.)

【**임용상의 주의사항**】

1. 경고: 1) 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것. 2) 매일 3잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다. 3) 심혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험 인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발현에 대하여 신중히 모니터링해야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 있는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발현되는 경우 취할 조치에 대해 사전에 알고 있어야 한다. 4) 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 고평가는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 개방 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 해야 하며, 중증의 위장관계 이상반응의 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 한다. 비스테로이드성 소염진통제를 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있다. 위궤양군의 환자에서는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료를 고려하여야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것: 1) 소화성 궤양 환자 2) 심한 혈액이상 환자 3) 심한 간장애 환자 4) 심한 신장애 환자 5) 심한 심기능부전 환자 6) 심한 고혈압 환자 7) 이 약의 성분과 관련된 증이 있는 환자 8) 기관지 천식 또는 그 병력이 있는 환자 9) 천식 환자 10) 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기 또는 알레르기 반응 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여후 치명적인 중증의 아나필락시스 반응이 드물게 보고되었다.) 10) 갑상선병 후외로슬(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것: 1) 소화성 궤양의 병력이 있는 환자 2) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자 3) 출혈성 질환이 있는 환자(혈소판 기능이상)이 일어날 수 있다.) 4) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 5) 신장애 또는 그 병력이 있는 환자 6) 심기능부전 환자 7) 고혈압 환자 8) 과민증의 기왕력이 있는 환자 9) 전신성 홍반성 루푸스(SLE) 환자 및 혼합결합조직질환(MCTD) 환자 10) 태양성 대장염 환자 11) 크론병 환자 12) 고령자 및 소아 13) 위약환자

4. 이상반응: 1) 속 : 드물게 속증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 흉고인대, 오한, 호흡곤란, 협착지 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다. 2) 혈액 : 드물게 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈, 과립구감소, 혈소판감소, 혈소판기능저하 (출혈시나 연장), 호산구증다 등의 혈액학적 이상 나타날 수 있으므로 혈액검사를 하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 있을 경우에는 즉시 투여를 중지한다. 3) 소화기계 : 드물게 소화성궤양 위장출혈, 천공, 궤양성대장염, 혈변, 위염, 폐출혈 등이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 또한 때때로 식욕부진, 구취, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위부불쾌감이나 매우 드물게 구갈, 구내염, 복부팽만감, 변비 등의 증상이 나타날 수 있다. 4) 피부 : 드물게 스티븐스-존슨증후군(파우절막양증후군) 또는 리델증후군(중증표피괴사증) 이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다. 5) 간장 : 드물게 황달, GOT, GPT, AL-P-상승증 등이 나타날 수 있다. 6) 과민증 : 드물게 천식발작의 유발, 두드러기, 습진, 자반, 때때로 천식, 가려움증이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다. 7) 감각기계 : 드물게 무시, 압통 등의 시각장애가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다. 또한 드물게 난청, 이명, 미각이상 등이 나타날 수 있다. 8) 정신신경계 : 드물게 무관성 수면증이 보고되어 있으므로 단독 투용, 구역, 구토, 불면, 목이 뻣뻣함, 발열 또는 의식장애 등의 증상이 나타나면 즉시 투여를 중단하고 의사와 상의하여 특히 자가면역질환(SLE, MCTD) 환자에게는 신중히 투여한다. 9) 순환기계 : 드물게 협착지, 혈압상승, 심계항진 등이 나타날 수 있다. 10) 신장 : 드물게 급성신부전을 일으킬 수 있으므로 판노, 혈노 등의 증상 및 뇨단백, BUN, 혈중 크레아티닌의 상승, 고칼륨혈증이 검사조건에서 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 한다. 요양감소, 전신부종 및 이에 수반한 습가름, 나른함 등이 나타날 수 있다. 11) 심혈관계 : 심부전이 있는 환자의 경우 급성 폐부종의 위험이 증가할 수 있다. 12) 기타 : 때때로 안와주위부종, 또한 매우 드물게 관대갈, 발열, 뇌출혈 등이 나타날 수 있다. 13) 국내 시판 후 조사 결과(시립제) : 국내에서 제삼사를 위하여 4년 동안 각각 654명, 469명의 환자를 대상으로 시판 후 조사를 수행한 결과는 다음과 같다.가) 654명의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 위약사례 발현율은 인과관계와 상관없이 0.61% (4명/654명, 42건)로 보고되었다. 4. 보형, 알부민중, 소화불량, 가려움증 등이 각각 0.15%(1명/654명, 1건)으로 조사되었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 있는 약물유해반응의 발현율은 0.66%(3명/654명, 3건)으로 보형, 알부민중, 소화불량 각각 0.15%(1명/654명, 1건)이었다. 예상하지 못한 약물유해반응은 보형 0.15%(1/654명, 1건)으로 보고되었다. 국내 시판 후 조사기간 동안 자발적으로 보고된 위약사례는 아나필락시스성 쇼크 1건, 발진 12건이 보고되었으며, 이는 불확실한 고도의 인구조단으로부터도 보고되었으나, 그 빈도 및 이 약과의 인과관계를 추정하기가 어렵다.나) 469명의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 위약사례 발현율은 인과관계와 상관없이 1.07% (5명/469명, 52건)로 보고되었다. 설사 0.85%(4명/469명, 4건), 구 0.21%(1명/469명, 1건)로 조사되었으며, 약물유해반응은 보고되지 않았다. 이 중 중대하거나 예상하지 못한 위약사례는 보고되지 않았다.

5. 일반적 주의: 1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 치료할 수 있는 최대 기간동안 최소 유효용량으로 투여한다. 2) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에 유익하다. 3) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음사항을 고려한다. ① 이 약을 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 임상검사(노검사, 전혈구 검사(CBC) 및 혈액형 검사 등) 혈액 검사, 간기능 검사 등)를 실시하고 이상이 있을 경우 감람, 휴약 등의 적절한 조치를 하며, 필요시 혈액형고검사(항혈액응고제투여시), 혈중 칼륨농도검사(칼륨저투여시)가 필요할 수 있다. ② 특히 리튬농도검사를 정기적으로 시행한다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발현되거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신기능 검사 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 한다. ③ 약물요법 이외의 치료법도 고려한다. 4) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 기울어야 한다. 소화성 궤양 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용

코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제의 장기 사용 일률 섭취, 고령, 허약한 건강상태 등이 있다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 자발적 보고의 대부분은 고평가 및 허약자에 대한 것이므로, 이러한 환자에게 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 한다. 8) 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사례의 발생률이 증가될 수도 있다. 치아잇게 이노제 또는 루프형 이노제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여하여야 한다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 한다. 9) 용혈성심부전 및 부종: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서 혈액 저류 및 부종이 관찰되었다. 이 약은 체액저류 또는 심부전이 있는 환자에서 신중히 투여해야 한다. 10) 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장유과사나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 신기능 부전 환자, 간기능 부전 환자, 이노제나 ACE 저해제를 투여 중인 환자, 고평가 등에서는 특별한 주의가 필요하다. 투여를 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복된다. 11) 진행된 신질환: 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진행된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 개시해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다. 12) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기능 수치의 상승이 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료가 지속됨에 따라 악화되거나 증가가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황달, 치명적 전적성 간염, 간괴사, 간부전(일부는 치명적임)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 암시하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에서 투여기간 동안 주의있게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발현되는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다. 13) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 해모글로빈치 또는 헤마토크리트 검사를 해야 한다. 비스테로이드성 소염진통제는 혈소판 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상태별로 작고 지속기간이 짧으며 가역적이다. 응고 관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약 투여시 신중히 모니터링 해야 한다. 14) 아나필락시스 반응 : 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아나필락시스양 반응은 약물에 노출된 경향이 없는 환자에서도 일어날 수 있다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비특 특이성 동반반응이나 동반하지 않거나 또는 실제로는 치명적인 중증의 기관지 경련을 나타내는 천식 환자에도 전형적으로 발생한다. 이러한 아나필락시스양 반응이 나타나는 경우 응급처치를 실시하여야 한다. 15) 피부반응: 이 약은 발락성 피부염, 스티븐스-존슨 증후군 및 독성 표피괴사 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이들 중대한 이상반응은 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 중대한 피부 발현 증상 및 중증에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 한다. 16) 천식 환자 중 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있다. 아스피린 민감성 천식 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지경련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자에서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지경련을 포함한 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않도록 한다. 17) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없다. 코르티코이드스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코이드로 - 반응성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다. 18) 이 약은 벤조산나트륨을 포함하고 있으며, 벤조산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다

6. 사용주의: 1) 다른 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와 병용투여시 위장관계 이상반응, 위장관 출혈 등 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용투여하지 않는다. 2) 글루코코르티코이드, 알코올과 병용시 위장관계 이상반응, 위장관 출혈의 위험이 있으므로 신중히 투여한다. 3) 다국산, 페니토인과 병용투여시 혈당증상을 증가시킬 수 있으므로 신중히 투여한다. 4) 프로베네시드, 셀핀파라존과 병용투여시 그 작용을 저하시키고 덱시부프로펜의 배설이 지연될 수 있으므로 신중히 투여한다. 5) 설포닐우레아제와 병용투여시 혈당감소를 유발할 수 있다. 6) 이노제, 항고혈압제와 병용투여시 효과가 감소할 수 있으므로 신중히 투여한다. 7) ACE 저해제 : 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 저해제의 항고혈압효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약과 ACE 저해제를 병용투여하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 한다. 8) 루로세미드 ① 임상시험 및 시판후 조사 결과 이 약의 신장에서의 프로스타글린인 합성 억제에 의해 일부 환자에서 루로세미드 및 치아잇게 이노제의 나트륨배설률 효과가 감소할 수 있음이 확인되었다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용투여하는 동안 신장애 증상 및 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 한다. ② 루로세미드와 병용투여시 그 작용을 저하시킬 수 있으므로 신중히 투여한다. 9) 아스피린 ① 아스피린과의 병용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전반응의 위험을 감소시킬 수 있다는 일관된 증거는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용에 의해 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으므로 두 약물의 병용은 일반적으로 권장되지 않는다. ② 아스피린과 병용투여시 이 약 및 다른 비스테로이드성 소염진통제의 작용을 저하시킬 수 있다. 10) 리튬 : 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글린인 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신클리어런스를 감소시킬 수 있다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의깊게 관찰해야 한다. 11) 메토트렉세이트 : 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와의 병용투여로 신세뇨관에서 메토트렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토트렉세이트의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 예방요법으로 사용하는 고용량의 메토트렉세이트와는 병용투여하지 않으며, 저용량의 메토트렉세이트와 병용투여시 신중히 투여하여야 한다. 12) 쿠마린계 항응혈제(와파린 등) ① 위장관계 출혈에 대하여 와파린과 비스테로이드성 소염진통제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다. ③ 쿠마린계 항응혈제와 병용투여하고 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감람하는 등 신중히 투여한다.

7. 임부에 대한 투여: 1) 동물실험에서 대식세포(고투여량에서) 감소 및 생존수의 약제가 보였음이 보고되어 있으며, 다른 해열진통소염제에서 태아손상치숙증(PEC)이 관찰된 것으로 보고되었으며 이 약은 임부 태에 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게 투여하지 않는 것이 바람직하다. 2) 이 약을 임부에 투여한 임상자료는 없다. 임신말기의 렉트에 투여한 실험에서 태기의 동맥관수축이 보고되어 있다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 임신 말기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있으므로 이 약은 특히 임신 말기에는 투여를 피해야 한다. 3) 렉트에 대한 실험에서 비스테로이드성 소염진통제는 프로스타글린인 합성을 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 난산의 발생 빈도를 증가시키고, 분만을 지연시키며 새끼의 생존율을 감소시켰다.

8. 수유부에 대한 투여 : 모유로의 이행이 보고되어 있으므로 이로 인해 영아에서 심각한 이상반응의 발생이 우려되므로, 수유부에 대한 약물 투여의 중요성을 고려하여 수유를 중단하거나 약물 투여를 중단해야 한다.

9. 소아에 대한 투여: 1) 신생아 및 6개월 미만의 영아에 대한 안전성 - 유효성이 확립되어 있지 않다. 2) 체중 30kg 미만의 어린이에 대해서는 1일량 300mg을 초과해서는 안된다. 3) 어린이에 있어서의 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 이상반응의 발현에 특히 유의한다.

10. 고령자에 대한 투여 : 고령자는 이상반응이 나타나기 쉬우므로 소량부터 투여를 개시하고 필요한 최소량으로 투여하며, 이상반응의 발현에 특히 유의하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다. (일반적주의항 참조)

11. 임상검사에 대한 영향: 드물게 요소질소, 트랜스아미나제, 알칼리포스파타제의 증가, 해모글로빈과 헤마토크리트값의 감소, 혈소판 응집저하, 출혈시간 연장 이 나타날 수 있다

12. 과량투여시 주의: 가능한 빠르게 위세척을 하거나 구토를 유발한다.

3. 보관 및 취급상의 주의사항: 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사교원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

14. 1일 허용량: 이 약 시럽 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(7개월 최상량 사용)할 것. 60kg 성인 : 1일 최대복용량 24g

【저장방법】 차광기밀용기, 상온(15~25)도보관 【포장단위】 50ml, 100ml, 500ml

※ 이 약은 자발 6개월 이후 갈변이 일어날 수 있지만, 갈변으로 인해 제품 함량이나 약효의 변화는 없습니다.

※ 이 약은 복용 전에 흔들어 사용하십시오.

◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변해 또는 손상된 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

◆ 이 설명서의 개정일자 2015년 09월 22일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지 (www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실 (080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다

◆ 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

DXS 2015.09.22-02



본사·공정·경도 화성시 합남읍 제곡공단2길80

(소비자상담실)080-080-4211