



고함량 메가비타민 B 100

맥스케어^{알파}

[無타르색소]

일반의약품
분류번호:316

【성분·함량】(1정 중)

유효성분 : 티아민질산염(KP)	100mg
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴산아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg
피리독신염산염(KP)	100mg
폴산(KP)	500μg
시아노코발라민(KP)	500μg
d-비오틴(USP)	500μg
콜린타르타르산염(USP)	100mg
이노시톨(KP)	100mg
γ-오리자놀(KP)	10mg
아스코르브산과립97%(별규)	52mg
(아스코르브산으로서)	50.44mg)

첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아크릴이산화색(93018508), 오파그로스클리어97W19196, 오파드라이AMB노란색80W92755, 오파드라이흰색OY-C-7000A, 이산화규소, 전화화전분, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 담황색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 비타민 B₁
 - 1) 다음 증상의 완화 - 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
 - 2) 각기
 - 3) 눈의 피로
- 비타민 B₂, 비타민 B₆ : 다음 증상의 완화
 - 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3 개월 미만의 젖먹이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 레보도파(피리독신 함유제제)

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 5) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 3) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 외부용기에 표기

【포장단위】 14정(PTP), 60정(병), 120정(60정x2)(병)

〈복용 및 보관시 주의사항〉

- 물기가 없는 손으로 약을 취급하시고 복용하는 동안에는 방습제를 제거하지 마십시오.
- 약병에 손을 넣지 마시고 반드시 뚜껑을 사용하여 한알을 덜어 복용하십시오.
- 복용 후에는 뚜껑을 잘 닫아서 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 제품을 냉장고에 보관하지 마십시오.

*구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 '소비자 분쟁해결기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

*본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)를 통하여 확인할 수 있습니다.

*부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

■제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
신일제약(주)
충청북도 충주시 양성면 복상골길 28

