

제조번호: 20*10
사용기한:

일반의약품

【성 상】 주황색의 장방형 필름코팅정

【용법·용량】 12세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정씩 1일 1회 복용

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

■ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

■ 제조자 : 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

【판매자】

BORYUNG
보령제약

경기도 안산시 단원구 봉안로 107
www.boryung.co.kr



종합영양제

푸른비타정



BORYUNG
보령제약

- 비타민C 600 mg, 비타민D
- 마그네슘, 아연, 셀레늄
- 비타민 B군, 토코페롤

육체피로 / 눈의 피로

체력저하 / 신경통·근육통·관절통

기미·주근깨 / 발육기·노년기

60정

【원료약품 및 분량】 이 약 1정 중

산화마그네슘(JP)50mg(마그네슘으로서30.15mg), 콜레칼시페롤과립(KPC)2.5mg(비타민D로서250.0IU), 산화아연(KP)27mg(아연으로서21.69mg), 셀레늄함유건조효모(KPC)29.23mg(셀레늄으로서38μg), 제피아스코르브산(KPC)618.56mg(아스코르브산으로서600mg), 토코페롤아세테이트 2배산(KPC)40mg(비타민E로서20.0IU), 티아민질산염(KP)60mg, 리보플라빈부티레이트(KP)5mg, 니코틴산아미드(KP)50mg, 판토텐산칼슘(KP)20mg, 피리독신염산염(KP)5mg, d-비오틴(EP)0.2mg, 폴산(KP)0.4mg, 시아노코발라민1000배산(KPC)24mg(시아노코발라민으로24μg), 첨가제(부형제):무수인산수소칼슘(KP)150mg, 첨가제(타르색소):황색4호, 황색5호

【효능·효과】 1. 다음경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. ·비타민D(콜레칼시페롤과립): 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방 / ·비타민B₁(티아민질산염): 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의피로 / ·비타민C(제피아스코르브산): 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈, 비출혈(코피) 예방 2. 아연의 보급

【사용상의 주의사항】 뒷면에 이어집니다. →

비타민과 미네랄은 체내에서 합성되지 않으므로 식품이나 영양제로 보충해주어야 하며 특히 현대인의 스트레스 및 불균형적인 식사에 의해 부족해지기 쉽습니다. 푸른비타정은 특히 현대인에게 부족해지기 쉬운 비타민D와 마그네슘이 충분량 처방되어 있고 각종 미네랄과 비타민이 고단위로 함유되어 있는 종합영양제로서 허약 체질이나 육체피로, 발육기 청소년과 노년기에 비타민과 미네랄을 공급해 줍니다. 푸른비타정은 인체에 유해한 활성산소와 유리기(Free radical)의 활동을 억제하는 항산화제(Vitamin C, E, 셀레늄, 아연)를 함유하고 있으며 특히 비타민C를 600mg 이나 함유하고 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에

과량의 옥살산염이 배설되는 상태) (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (5) 심장·순환기계기능 장애 환자 (6) 신장장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 강심배당체를 투여 중인 환자 (9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 (10) 신장결석 병력이 있는 환자 (11) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. (12) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우—구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수

있다. (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (9) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. (10) 알도스테론제, 트리암 테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (11) 우발적으로 과량복용 한 경우 (12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60정

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.

■ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

■ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.

■ 본 첨부문서 최종 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 소비자상담전화 02-843-1500에서 확인 할 수 있습니다.

■ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>) 의약품정보를 참조하십시오.

■ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭->보고마당->안전성정보->)의약품유해사례보고에 알려주시기 바랍니다.

■ 본 제품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

■ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.

■ 본 제품에 대한 의문사항은 소비자 상담전화 02-843-1500으로 문의하십시오.

■ 제조자: 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

최종개정연월일(2013.04.15)

판매자:



BORYUNG

보령제약

경기도 안산시 단원구 농안로 107

www.boryung.co.kr