

마이아스콧 골드정

일반의약품 분류번호: 319 기타의 비타민제

【원료약품 및 그 분량】1정 (940mg)중

산화마그네슘(KP)	100mg	콜레칼시페롤과립(EP)	4mg
(마그네슘으로서 60.3mg)		(비타민D로서 400IU)	
시아노코발라민(KP)	100μg	유비데카레논(KP)	5mg
피리독신염산염(KP)	20mg	산화아연(KP)	18.7mg
판토텐산칼슘(KP)	40mg	(아연으로서 15.0mg)	
티아민염산염(KP)	20mg	폴산(KP)	0.25mg
니코틴아미드(KP)	100mg	비오틴(USP)	0.25mg
리보플라빈(KP)	20mg	무수인산수소칼슘(KP)	169.74mg
아스코르브산97%과립(별규)	206.5mg	(칼슘으로서 50.0mg)	
(아스코르브산으로서 200mg)			

【성상】진주빛을 띤 오렌지색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민(D, B1, B2, B6, C)의 보급:

·육체피로 ·임신 ·수유기 ·병중 ·병후의 체력자하 ·발육기 ·노년기

2. 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

3. 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 건통(아깨결림, 어깨통증) 등), 각기, 눈의 피로

4. 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

5. 아연의 보급

【용법·용량】12세 이상 및 성인: 1회 1정 1일 2회 복용하십시오.

※ 사용상의 주의사항



1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 고옥살산노증환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 6) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 7) 신장장애 환자
- 8) 저단백혈증 환자



- 9) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 11) 신장결석 병력이 있는 환자
- 12) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 9) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해 할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】90정, 90정X2, 150정

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다.
- * 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 수신자부담 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.
- * 본 제품은 영·유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- * 본 제품을 복용할 때에 정제가 기도에 걸릴 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.

작성년월일: 2015. 12. 23

【제조자】한국콜마(주) 세종특별자치시 천의면 산단길 245

【제조의뢰자】광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114
www.ekdp.com