

※ 사용 전에 첨부문서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

분류번호:321

KGMP적격업체

# 파워본 POWER BONE Soft caps.

연질  
캡슐

1일 1회, 흡수율을 높이는 비타민D 함유 캡슐

- ✓ 골격
- ✓ 임신·수유
- ✓ 노년기 비타민D 보급
- ✓ 성장발육에 도움

Ca

+

Vit.D

## 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 인산수소칼슘수화물(KP).....              | 590.00mg |
| (칼슘으로서 137.41mg, 인으로서 106.19mg) |          |
| 글루콘산칼슘수화물(KP).....              | 163.00mg |
| (칼슘으로서 14.57mg)                 |          |
| 콜레칼시페롤농축물(유상형)(BP) .....        | 0.33mg   |
| (비타민 D로서 330IU)                 |          |
| 첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호   |          |
| 첨가제(동물유래) : 젤라틴 : 소(가축)         |          |

【성상】 유백색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

## 【효능·효과】

- 다음의 경우에 비타민D의 보급
  - 임신·수유기
  - 발육기
  - 노년기
- 이 약에 포함된 비타민의 효능·효과는 다음과 같습니다.
  - 뼈·이의 발육불량
  - 구루병의 예방

【용법·용량】 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

## 【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
  - 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환환자
  - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
  - 12개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
  - 신결석 환자
  - 중증(심한 증상)의 신부전 환자
  - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
  - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
  - 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
  - 임부, 수유부
  - 심장, 순환기계기능 장애 환자
  - 신장에(신장장애) 환자
  - 저단백혈증 환자
  - 강심배당체를 투여 중인 환자
  - 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

### 3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
  - ① 구역, 구토, 설사
  - ② 빈맥, 저혈압, 얼굴달아오름, 심장박동불규칙, 구역질, 피부발진
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

### 4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검 할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

### 5. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리아멘텐과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용(사용))투여하지 않습니다.
  - 가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

### 6. 수유부에 대한 투여

- 1) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

### 7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보존하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【판매처】 (주)대웅생명과학 / 서울시 강동구 성내1동 469-6

【제조처】 알앤피코리아(주) / 경기도 화성시 향남면 상신리 906-6

【제조의뢰처】 청계제약(주) / 경기도 화성시 양감면 대양리 1106-4

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

※ 제품에 관한 문의는 전화(02-554-2639)로 하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 정보마당 → 의약품정보를 참조하세요.

작성년월일 : 2011년 05월 12일



설명-128-01-1