

큐텐업골드연질캡슐

일반의약품

의약품 분류번호	319 기타의 비타민제
-------------	-----------------

1. 큐텐업골드연질캡슐은 비타민A, B₆, C, E, 셀레늄, 아연 등과 강력한 항산화 성분인 코엔자임Q10이 함유된 제품입니다.
2. 큐텐업골드연질캡슐은 하루 한 캡슐로 간편하게 복용할 수 있어 바쁜 현대인에게 편리하고 경제적입니다.
3. 음식물로 충분히 섭취가 어려운 코엔자임Q10을 편리하게 보충할 수 있습니다.
4. 항산화효과는 물론 육체피로와 체력저하에도 그 효과가 뛰어납니다.

【원료약품의 분량】 (1캡슐 중)

유비데카레논(KP)	10mg
셀레늄함유건조효모(KPC) (셀레늄으로서 50μg)	92.6mg
베타카로틴30%현탁액(KPC) (베타카로틴으로서 9mg)	30mg
아스코르브산(KP)	300mg
토코페롤아세테이트(KP) (비타민E로서 200IU)	200mg
γ-오리자놀(KPC)	10mg
피리독신염산염(KP)	10mg
0.1%시아노코발라민(KPC) (시아노코발라민으로서 4μg)	4mg
항산화아연(USP)	27.7mg
(아연으로서 10mg)	
항산화망간(USP) (망간으로서 1mg)	3.1mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 적색3호	

【성상】

적색 내용물이 충전된 암갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

다음경우의 비타민 A, E, B₆, C의 보충

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후의 체력저하
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조함의 완화
 - 야맹증
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림(손발저림)·수족냉증(손발 차가움)

【용법·용량】

12세이상 및 성인 : 1일 1회 1캡슐 식후 복용

【사용상 주의사항】

1. 경 고
임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성 있는 부인에는 비타민A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 않는다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아(갓난 아기)
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것:(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장애(신장 장애) 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 당남(췌관)관련 질환, 간질환 환자
 - 8) 위장관 질환
 - 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
4. 부작용
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. : 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈

- 되어 붉어짐), 피부염, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU이상을 넘지 않도록 한다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
 - 가) 인산염, 칼슘염, 경구용(먹는)테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 나) 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경종 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000 IU/일 마만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 2) 임신이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.

8. 임상 검사치에의 영향

각종 요 검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질의 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 080-424-7999

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 직사광선(또는 열)에 약하므로 과도한 햇빛노출이나 고온보관은 삼갈 것.
3. 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 연질캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 연질캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의할 것.

설명서 작성연월일 : 2011. 02. 01.

제조원



한미약품(주)

경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

판매원



한미메디케어(주)

서울특별시 송파구 방이동 48-9

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 010921

ver.01092001