

트로페린® 점안액(1회용)

(페닐레프린염산염 · 트로픽아미드)

전문약품

의약품 분류번호	131 안과용제
-------------	-------------

【원료약품의 분량】 1mL 중

페닐레프린염산염(USP)	5mg
트로픽아미드(USP)	5mg
첨가제(안정화제) : 아미노카프로산	
첨가제(등장화제) : 붕산	
첨가제(pH조절제) : 염산	
첨가제(용제) : 주사용수	

【성상】 무색 플라스틱 용기에 든 무색 내지 옅은 황색의 투명한 점안제

【효능·효과】 진단 또는 치료를 목적으로 하는 산동 또는 조절 마비

【용법·용량】

- 산동에는 1회 1~2방울을 점안한다. 또는 1회 1방울을 3~5분 간격으로 2회 점안한다.
- 조절마비에는 1회 1방울을 3~5분 간격으로 2~3회 점안한다.
- 점안 후 남은 액과 용기는 바로 버린다.

【사용법】



1 손가락으로 용기 뚜껑을 열고, 용기를 분리합니다. 분리하고 남은 나머지 1회용 용기는 보관되어 있던 박스에 넣습니다.



2 용기를 세워서 잡고 액액이 용기의 하단에 있는지 확인합니다.



3 제품상단의 손잡이와 제품하단의 손잡이를 잡고 돌리면 용기와 뚜껑이 분리됩니다. 이 때 액액의 오염 방지를 위하여 뚜껑 및 액액이 흘러나오는 용기 끝 부분에 손이 닿지 않게 합니다.



4 개봉시의 용기 파편을 제거하기 위하여 최초 사용 시 1~2방울은 점안하지 않고 버립니다.



5 용기의 끝이 직접 눈에 닿지 않도록 주의하여 점안합니다.



6 무균제품으로서 개봉 후 1회만 즉시 사용하고, 남은 액액과 용기는 바로 버립니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
녹내장 또는 혈우각과 전방이 좁은 경우 등의 안압상승의 소인이 있는 환자(급성 폐색 우각 녹내장의 발작을 일으킬 수 있다.)
- 다음의 경우에는 신중히 투여할 것.
1) 소아(전신의 부작용이 일어나기 쉽다.)
2) 고혈압 환자
3) 동맥경화증 환자
4) 관부전 또는 심부전 등의 심질환 환자
5) 당뇨병 또는 갑상선 기능항진증 환자
- 부작용
1) 속 : 속이 나타날 수 있으므로 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
2) 과민증 : 안검발적, 종창, 가려움 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
3) 눈 : 각막상피장애, 안압 상승 등의 증상이 나타날 수 있다.
4) 기타 : 속, 구갈, 안면홍조, 빈맥, 혈압 상승 등의 전신 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 일반적 주의
1) 염산페닐에프린은 안과영역 사용시 치료를 지연시키고 충혈 및 밀폐된 녹내장각 침전을 유발한다는 보고가 있다.
2) 산동이나 조절마비가 일어날 수 있으므로 회복시까지 운전이나 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다(또한 선글라스를 착용하는 등 태양광선이나 강한 빛을 직접 보지 않도록한다.).
- 상호작용
MAO저해제로 치료중인 또는 치료 후 3주가 경과되지 않은 환자와 삼환계 항우울약으로 치료중인 환자에서 급격한 혈압상승을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
- 소아에 대한 투여
소아에 투여시 전신적인 부작용이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하면서 신중히 투여한다. 특히, 미숙아에서 사맥,무호흡 일어났다는 보고가 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되면 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 필요에 따라 이 약을 희석해 사용하는 것이 바람직하다.
- 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 주의한다.
- 적용상의 주의
1) 점안시 환자는 원칙적으로 누운 상태에서 눈꺼풀을 들어 결막낭내에 점안하고 1~5분간 눈꺼풀을 닫고 누낭부를 압박한 후 눈을 뜬다.
2) 변색하거나 침전되어 생긴 것은 사용하지 않는다.
3) 점안용유로만 사용한다.
4) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
5) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
6) 개봉한 후에는 1회만 즉시 사용하고, 남은 액과 용기는 바로 버린다.
- 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록(습기가 적은)서늘한 곳에(밀전하여) 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30개(0.8mL/튜브×6×5개)/카톤

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
2. 먹지 마십시오. 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자제(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2017. 04. 24

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자에게는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.