

1일 1회, 흡수율을 높이는 비타민D 함유 칼슘제

본엔디

Bone&D soft cap.



골격(뼈)과
치아의
구성성분

임신·수유기의
비타민D보급

성장발육에
도움

구루병
예방

【성분 및 함량】 1캡슐 중

인산수소칼슘수화물(KP)	590.00mg
(칼슘으로서 137.41mg, 인으로서 106.19mg)	
글루콘산칼슘수화물(KP)	163.00mg
(칼슘으로서 14.57mg)	
콜레칼시페롤농축물(유상형)(BP)	0.33mg
(비타민D로서 330IU)	
첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호	

【성상】 유백색의 유상내용물을 함유한 알갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

다음 경우의 비타민 D의 보급

- 임신·수유기 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- ① 뼈, 이의 발육 불량 ② 구루병의 예방

【용법·용량】 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아(갓난아기).
- 4) 신결석 환자
- 5) 중증(심한 증상)의 신부전 환자
- 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
- 3) 임부, 수유부
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장애(신장장애) 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 감심배당체를 투여 중인 환자
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜주십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소하십시오.

5. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 사용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 사용)투여하지 마십시오.
- 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 임부·수유부, 폐쇄아, 유아에 대한 투여

- 1) 베타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 오(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 하십시오.
- 첨부문서 최종 개정연월일(2011.01.06) 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인할 수 있습니다.

설명서 개정연월일 : 2011.01.06

P1012-01

제조의뢰자



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조자

경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6

알앤피코리아(주)