

히알루 주사 1.5%

(히알루론산나트륨)

전문의약품

의약품 분류번호	131 안과용제
-------------	-------------

【원료약품의 분량】 1mL 중

주성분: 히알루론산나트륨(KP) 15mg

등장화제: 염화나트륨

완충제: 인산일수소나트륨칠수화물, 인산이수소나트륨일수화물

용제: 주사용수

【성상】

무색 투명하고 점도성이 있는 액이 위아래가 고무마개로 막힌 무색투명한 프리필드시린지에 든 주사제

【효능·효과】

백내장 수술(수정체 이식), 각막이식수술, 녹내장수술 등 각종 안과수술 보조제

【용법·용량】

1. 백내장 수술 및 안내 렌즈 이식술 : 이 약 필요량을 바늘 또는 캐놀라를 통해 수정체 제거 전 또는 후에 안구전방에 천천히 주입한다. 백내장 적출전 및 안내렌즈 삽입전에 주입되어야만 보조제로서의 각막내피 보호효과가 최적일 수 있으므로 안내 및 낭외 백내장 수술전에 주입한다. 이 약은 수술기구 및 삽입될 안내렌즈의 코팅에 사용될 수 있다.
2. 각막이식술 : 각막이식편을 제거하고 각막표면과 수위가 맞을 때까지 이 약으로 전방을 채운다. 이 약 위에 공여 이식편을 놓고 봉합한다.
3. 녹내장 여과술 : 섬유주 절제술동안 전방용량을 보충하고 유지하기 위해 이 약을 각막전차를 통해 주입한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약 성분 및 단백질제 약물에 과민증의 병력이 있는 환자
2. 부작용
 - 1) 눈 : 때때로 안압 상승, 드물게 염증반응, 각막부종, 각막혼탁, 전방출혈, 홍채 신생혈관, 홍채 후괴양, 결막유착부전, 산동, 수정체 혼탁, 동통, 소양증, 시력불선명, 각막 대상기능장애 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 기타 : 때때로 안내 렌즈 표면의 혼탁이 생길 수 있다.
 - 3) 첨가제 : 이 약은 인산염을 포함하고 있다. 상당한 각막 손상이 있는 일부 환자에서 인산염 함유 점안액의 사용과 연관되어 각막 석회화의 사례가 매우 드물게(0.01% 미만) 보고된 바 있다.
3. 일반적 주의
 - 1) 특히 수술 직후 주의깊게 안압을 조사하고 안압상승이 일어나면 적절한 처치를 한다.
 - 2) 가능한 한 수술후 세정, 흡인 등에 의해 이 약을 제거하는 것이 바람직하다.
 - 3) 초음파유화흡인술을 하기 전에 흡인관류를 하여, 수정체와 이 약과의 사이에 관류액으로 채워진 공간을 만들어야 한다.
 - 4) 염화벤잘코늄 등과 같은 4급 암모늄을 함유하는 용액으로 수술용구 등을 세척해서는 안 된다.
4. 상호작용
히알루로니다제와 병용투여하지 않는다.
5. 적용상의 주의
 - 1) 투여경로 : 안과용으로 용법·용량에 따라 투여하고 절대로 혈관내에 주입하지 않는다.
 - 2) 투여시
 - ① 냉소에 보관하고 사용전 실온에서 30분간 방치한 후 사용한다.
 - ② 이 약은 염화벤잘코늄 등 제4급 암모늄 및 클로르헥시딘에 의해 침전을 생성하므로 충분히 주의한다.
 - ③ 개봉후의 사용은 1회로 하고 잔액은 용기와 함께 폐기한다.
 - ④ 이 약과 공기를 혼합하여 사용할 경우 홍채 아래 공기가 들어가지 않도록 주의한다.
 - ⑤ 주의깊게 천천히 주입한다.
 - ⑥ 전방내에 주입할 경우 과다하게 주입되지 않도록 한다.(수술후 안압상승의 원인이 될 수 있다.)
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】

차광된 밀봉용기, 2~8℃ 냉장보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】

1관(0.85mL/관x1)/카톤

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
2. 먹지 마십시오. 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
3. 유리가 파손될 우려가 있으니 주의하십시오.
4. 개봉 후 바로 사용하십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2016. 12. 14

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 평택시 팽성읍 추팔산단로 114

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고,
설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.