

일반의약품
분류번호 265

[테르비나핀]

로시놀 겔

시원한 쿨링효과와 끈적임 없는 겔 타입

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

유효성분 : 테르비나핀 (별규)..... 10 mg
첨가제(보존제) : 벤질알코올 (KF)..... 2.0 mg
기타 첨가제 : 소르비탄스테아레이트, 에탄올, 이소프로필미리스테이트,
정제수, 카르보머 940, 트롤라민, 폴리소르베이트60

【성상】 흰색 또는 화백색의 젤제입니다.

【효능·효과】

1. Trichophyton(족, T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부상상균에 의한 피부진균[곰팡이] 감염증 : 족 부백선[무좀], 고부백선[대퇴부백선], 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare(Malassezia furfur)에 의한 전포[어루러기]

【용법·용량】

사용방법: 이 약은 1일 1회 적용합니다.

적용 전에 감염부위를 깨끗하게 씻고 말린 후 감염부위 및 그 주위에 얇게 바르십시오. 간헐성 감염(유방 밑, 손, 발가락 사이, 둔부[엉덩이] 사이, 서혜부)의 경우, 야간에는 거머즈를 덮어 사용할 수도 있습니다.

치료기간: 1일 1회 1주

증상의 경감은 통상 2~3일 이내에 나타납니다. 불규칙한 사용 또는 조기 투약중지 시 재발의 위험성이 있습니다. 1주일 투약 후에도 증상이 개선 징후가 없다면 진단을 확인해 보아야 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 1. 다음 환자에는 사용하지 마십시오.
테르비나핀 및 이 약 성분에 대해 과민증의 전력이 있는 환자
- 2. 부작용
1) 피부 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 가려움, 자극감이 적용부위에 나타날 수 있습니다.

3. 임부, 수유부에 대한 사용

- 1) 동물에 대한 생식독성시험에서 태자독성의 위험성이 보고되지는 않았지만, 임부에 투여하는 경우에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)하는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 이 약은 모유 중에 분비되므로, 이 약을 투여 중인 수유부는 수유를 중지하십시오.

4. 어린이에 대한 투여

어린이에 대한 사용경험이 제한적이므로 투여하지 마십시오.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용하십시오.
- 2) 눈 주위에는 사용하지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 30℃ 이하 저장

【포장단위】 15g

- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자 의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효 기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성일자 (2018년 7월 24일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실 (080-260-0033) 로 문의하시기 바랍니다.

제조사명



(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무곡로85번길 26 TEL.031)260-9300
소비자 상담실 TEL. 080-260-0033

설명-10-2802-5