

## 칼디업 츄어블정

Cal-D-Up Chewable Tab.

## 원료약품의 분량 1정 중

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 탄산칼슘(USP) .....         | 1,500mg (칼슘으로서 600mg) |
| 콜레칼시페롤농축분말(BP) .....    | 4mg (비타민D로서 400I.U.)  |
| 첨가제(감미제)-아스파탐(NF) ..... | 6mg                   |

성상 흰색 원형의 씹어 먹는 정제

효능·효과 칼슘결핍 및 기타 칼슘 보급을 필요로 하는 경우

## 용법·용량

●성인 및 12세 이상 소아 : 1일 1회 1~2정 ●3~12세 : 1일 1회 1/2~1정  
 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

## 사용상의 주의사항

## 1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미(단맛)제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

1) 이 약을 복용하는 동안 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계제제, 제산제를 복용하지 말 것

2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로, 이 약을 투여하는 동안 수유는 하지 않을 것이 권장되며, 투약 전에 의사 또는 약사와 상의하도록 한다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 과칼슘혈증(Hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 신질환 환자

3) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자

4) 3세 미만의 유·소아

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피할 것

2) 임부 및 수유부

3) 심장, 순환기계기능 장애 환자

4) 신장애(신장장애) 환자

5) 자단백혈증 환자

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약은 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진이 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것

7. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 유효 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.

3) 오염용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

저장방법 밀폐용기, 25℃이하 보관

포장단위 30, 60 정

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

작성일 이후 변경된 내용은 [www.huons.com](http://www.huons.com)에서 확인하실 수 있습니다. 작성일 : 2011.04.

소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700

EJ3211-01

## 주식회사 휴온스

충청북도 제천시 왕암동 957번지  
 957, Wangam-dong, Jacheon-st,  
 Chungcheongbuk-do, Korea

Huons