

비타알부콜^정성상
성분·함량

갈색의 필름코팅정

이 약 1정 중

간조레티놀아세테이트분말(비타민A로서 4,000IU(별규).....	8mg
에르고칼시페롤과립(에르고칼시페롤로서 400IU(KPC).....	0.47mg
초산도코페롤50%(토코페롤아세테이트로서 30IU(KPC).....	60mg
아스코르브산90%과립(아스코르브산으로서 250mg(별규).....	280.9mg
질산치아민3배산(치아민질산염으로서 10mg(KPC).....	30mg
리보플라빈3배산(리보플라빈으로서 10mg(KPC).....	30mg
염산피리독신3배산(피리독신염산염으로서 5mg(KPC).....	15mg
니코틴산아미드(KP).....	100mg
0.1%시아노코발라민(시아노코발라민으로서 5µg(KPC).....	5mg
푸마르산철(철로서 20mg(KP).....	60.8mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 25mg(KP).....	41.4mg
황산망간수화물망간으로서 1mg(USP).....	3.08mg
산화이연(이연으로서 20mg(KP).....	24.93mg
무수황산동(구리로서 2mg(BP).....	5.03mg
오오드화칼륨(오오드로서 150µg(KP).....	196.0
참가제(타르색소) : 적색40호, 청색호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크	

효능·효과

1. 다음경우의 비타민 A, D, E, B₁, B₂, B₆, B₁₂, C의 보급 :

1) 육체피로, 2) 임신·수유기, 3) 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시, 4) 발육기, 5) 노년기

6) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

·눈의 건조감의 완화 ·야맹증(밤에 잘 못보는 증상) ·백, 이의 발육불량 ·구루병의 예방

2. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료 3. 아연의 보급

용법·용량

사용상의
주의 사항

성인 1회 1정, 1일 1회 복용하십시오.

1. 경고

1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 마십시오.(비타민A 결핍증 환자 는 제외)

2) 만6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 과칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육장종, 신질환 환자.

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자

3) 만세 미만의 영아(갓난아기)

4) 과칼륨혈증환자

5) 할스씨병

6) 혈액소중혈대사이상으로 침이 간성, 체성(이차)에 침착하는 질환, 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈

7) 중증(심한)증상의 신부전 환자

8) 임부

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오)

1) 만세 미만의 영아(갓난아기)

2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.

4) 과수산소중환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

5) 수유부

6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환에 있는 환자

7) 심장·순환기계기능 장애 환자

8) 신장에(신장장애) 환자

9) 저단백혈증 환자

10) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자

11) 급, 만성 기관지염, 폐부종(부기)환자

12) 알칼리증, 소화성궤양

4. 부작용

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종(무기), 설사, 위부 불편감, 변비, 발진, 발적출혈되어 붉어짐, 묽은 변, 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부(배부) 불편, 위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부 통증, 알레르기반응, 혈관부종(무기), 관절통, 호산구증가, 요오드 중독증, 홍반(붉은반점), 후천성면역결핍증, 중추신경계 기능저하, 과칼슘혈증, 구역질, 가스천, 위장통증, 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종(무기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 여섯보다 빨리되거나 양이 정정 될수있을 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 예스트로젠을 포함한 경구용약은 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈관마혈성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전혈관마혈성의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피타독산 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy) 및 초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화가 나타날 수 있습니다.
- 6) 임신이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment) : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 과오산혈증(hyperursemia) : 혈액 중에 오산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부정맥 등 의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜주세요.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 이 약에 함유된 비타민D는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 하십시오.

6. 상호작용

- 1) 할로페리돌, 트리암테린과 병용투여할 때 복용시 과칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여할 때 복용하지 마십시오.
 - 가) 안산염, 칼슘제, 경구용약은 테트라사이클린계 제제, 제산제, 내 리보도파
 - 나) 리보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 일부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 1) 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에서는 비타민A 결핍증치에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민A 보균을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 하십시오.
- 2) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 3) 임신·수유 중 과량복용시 태아 및 영아(갓난아기)의 갑상선기능장애 및 갑상선증을 유발할 수 있습니다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사에 해당 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 형색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여서 보관하십시오.
- 3) 외장포장·내용물을 파고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

포장 단위

자사포장단위

저장 방법

차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)

- * 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
- * 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- * 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 약약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- * 첨부문서 최종 개정연월일(2011.03.17) 이후 변경된 내용은 이드링크(<http://ezdrug.kda.go.kr/kda2>)에서 확인할 수 있습니다.
- * 제품의 사용기한은 외포 포장에 표기되어 있습니다.

설명서 개정연월일 : 2011.03.17

P1105-01

자조판매인



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 학갈동 182-4

소매자상당설 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담설 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr