



소화성궤양치료제

에소프라졸®

(에소모페프라졸)

캡슐

20mg

Esoprazol Cap.

■ 성분·함량 : 1캡슐 중

에소모페프라졸(법규) 20mg

첨가제(타르색소) : 적색 3호, 청색 1호

■ 성상

흰색 내지 연한 황갈색 과립을 함유하는 상하부 불투명한
보라색의 경질캡슐제

■ 효능·효과

1. 위식도 역류질환(GERD)
 - 미란성 역류식도염의 치료
 - 식도염 환자의 재발방지를 위한 장기간 유지요법
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법
2. 헬리코박터피로리 박멸을 위한 항생제 병용요법
 - 헬리코박터피로리 양성인 십이지장궤양의 치료
 - 헬리코박터피로리 양성인 소화성궤양 환자의 재발방지
3. 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법
4. 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양의 치료
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의 예방
5. 출렁가-엘리스 증후군의 치료
6. 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법

■ 용법·용량

이 약은 물 등의 액체와 함께 섭취하여 씹거나 부수어서는 안된다.
캡슐제를 삼키기 어려운 환자들은 이 약을 비탄산수 반 컵에 캡슐을 열어
내용물을 넣어 복용할 수 있다. 다른 음료는 장용피를 용해시킬 수 있으므로
사용해서는 안 된다.

캡슐제를 열어 내용물을 물에 넣고 저은 후, 즉시 씹지 말고 그대로 마시고,
복용한 컵을 비탄산수 반 컵으로 행구어 이를 다시 마신다. 물에 떠있는 약
알갱이는 복용 중에 씹거나 부수어서는 안 된다.
캡슐제를 삼키기 못하는 환자들은 캡슐을 열어 내용물을 비탄산수에 넣고
즉시 위장관 튜브를 이용하여 투여할 수 있다. 이 경우 내용물이 녹거나 봉
해된 것을 투여해서는 안 된다. 또한, 이 때 선택한 주사기와 튜브에 대한
적합성을 주의 깊게 검사하는 것이 중요하다.

위장관 튜브를 이용한 투여방법은 다음과 같다.

- ① 적합한 주사기에 캡슐을 열어 내용물을 넣고 약 50mL의 물을 넣는다.
- ② 즉시 약 15초 동안 주사기를 세게 흔든다.
- ③ 주사기 끝을 위로 올려서 끝이 막히지 않았는지 확인한다.
- ④ 끝을 올린 상태에서 주사기를 튜브에 연결한다.
- ⑤ 주사기를 흔든 후 그 끝을 아래로 향하게 하여 즉시 튜브에 5~10mL
을 주입한다. 주입한 후 주사기 끝을 위로 향하게 하여 주사기를 흔든
다. (주사기 끝이 막히지 않도록 하기 위하여 반드시 주사기 끝을 위를
향하도록 올린 상태에서 유지한다.)
- ⑥ 주사기 끝을 다시 아래로 하여 즉시 5~10mL를 튜브에 주입한다. 주
사기 안의 약물 투여가 끝날 때까지 이 과정을 반복한다.

주사기 안에 침전물이 남아 있을 때에는 주사기에 물을 넣고 ⑤를 반
복한다.

1. 성인

- 1) 위식도 역류성 질환(GERD)
 - 미란성 역류식도염의 치료 : 4주동안 1일1회, 1회 40mg를 투여한다.
식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복
용한다.
 - 식도염 환자의 재발 방지를 위한 장기간 유지요법 :
1일 1회, 1회 20mg
 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법 :
• 1일 1회, 1회 20mg. 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가
진료가 필요하다.
 - 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회 20mg를
투여하여 조절한다.
 - 성인에서, 1일 1회, 1회 20mg를 필요시마다 투여할 수 있다. 비스
테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위험이
높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투여하는
것을 권장하지 않는다.
- 2) 헬리코박터피로리 박멸을 위한 항생제 병용요법
이 약 20mg를 아목사실린 1g, 클레트리마이신 500mg과 병용하여
1일 2회, 7일간 투여한다.
- 3) 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성)투여와 관련된 상부
위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법
• 1일 1회, 1회 20mg. 4주후에도 증상이 조절이 되지 않을 경우 추
가진료가 필요하다. 4주를 초과하는 임상시험은 실시되지 않았다.
- 4) 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양의 치료 :
1일 1회, 1회 20mg 치료기간은 4~8주이다.
 - 비스테로이드소염진통제 투여와 관련된 위궤양 및 십이지장궤양의
예방 : 1일 1회, 1회 20mg.
- 5) 출렁가-엘리스 증후군의 치료
권장 초회 용량은 40mg 1일 2회 투여이다. 이후 용량은 환자별로 조
절되어야 하며, 임상증상이 있는 동안 치료를 지속해야 한다. 임상자료
에 따르면, 대부분의 환자는 1일 80~160mg의 용량에서 조절 가능하
다. 1일 80mg 이상의 용량은 1일 2회로 나누어 복용하도록 한다.
- 6) 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후
의 유지 요법
정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후
4주동안 1일1회, 1회 40mg를 투여한다.

2. 12세 이상의 청소년

- 1) 위식도 역류성 질환(GERD)
 - 미란성 역류식도염의 치료 : 4주동안 1일1회, 1회 40mg를 투여한다.
식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 복

용한다.

- 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상치료요법 :

- 1일 1회, 1회 20mg. 4주후에도 증상 조절이 되지 않을 경우 추가
진료가 필요하다.
 - 일단 증상이 완화되면 그 후 연속되는 증상은 1일 1회, 1회
20mg를 투여하여 조절한다.
 - 성인에서, 1일 1회, 1회 20mg를 필요시마다 투여할 수 있다. 비스
테로이드소염진통제 투여로 위궤양 및 십이지장궤양의 발현 위
험이 높은 환자에게는 연속되는 증상 조절을 위해 필요시마다 투
여하는 것을 권장하지 않는다.
3. 12세 미만의 소아 : 이 약을 12세 미만의 소아에 투여한 경험은 없다.
 4. 신기능장애 : 용량을 조절할 필요는 없다. 중증의 신부전환자에 투여한 예
가 많지 않기 때문에 신중히 투여해야 한다.
 5. 간기능장애 : 경증-중증도의 간장애 환자에서 용량을 조절할 필요는 없
다. 중증 간장애환자의 경우 이 약 20mg 용량을 초과해서는 안된다.
 6. 고령자 : 용량을 조절할 필요가 없다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤즈이미다졸류에 과민반응 및 그 병력
이 있는 환자
- 2) 페니실린계 항생제에 과민반응 환자(헬리코박터피로리 박멸을 위해 아
목사실린과 병용요법시)
- 3) 마크로라이드계 항생제 과민반응 환자(헬리코박터피로리 박멸을 위해
클레트리마이신과 병용시에 한함)
- 4) 테르페나딘, 시사프리드, 피모지드, 아스테미졸을 투여 받고 있는 환자
(헬리코박터피로리 박멸을 위해 클레트리마이신과 병용시에 한
함)(4. 상호작용항 참조)
- 5) 아타치나비르 및 네피나비르를 투여 중인 환자(4. 상호작용항 참조)
- 6) 수유부

2. 이상반응

- 1) 다음의 이상반응이 임상시험과 시판 후 조사에서 확인 또는 의심되었
다. 용량 상관성은 없었다. 이상반응을 빈도에 따라 분류하였다(자주
>1/100, <1/10 ; 때때로 >1/1,000, <1/100 ; 드물게 >1/10,000,
<1/1,000 ; 매우 드물게 <1/10,000).
 - 혈액 및 림프계 : 드물게 백혈구감소증, 저혈소판증, 매우 드물게 무
과립구증, 범혈구감소증
 - 면역계 : 드물게 발열, 혈관부종, 아나필락시스 반응/쇼크 등과 같은
과민반응
 - 다사/영양 : 때때로 말초 부종, 드물게 저나트륨혈증, 매우 드물게 저
마그네슘혈증(중증의 저마그네슘혈증은 저칼슘혈증을 유발할 수도
있다. 저마그네슘혈증은 또한 저칼륨혈증을 유발할 수 있다.)
 - 정신계 : 때때로 불면, 드물게 초조, 정신 혼란, 우울, 매우 드물게 공
격성, 환각
 - 신경계 : 자주 두통, 때때로 어지럼(dizziness), 지각이상, 졸음, 드물
게 미각장애
 - 시각 : 드물게 흐린시력
 - 청각 및 미로계 : 때때로 어지럼(vertigo)
 - 호흡기계 : 드물게 기관지경련
 - 위장관계 : 체장염, 자주 복통, 변비, 설사, 복부팽만감, 구역·구토,
때때로 구강건조증, 드물게 구내염, 위장관 칸디다증, 매우 드물게 현
미경적 결장염
 - 간담도계 : 때때로 간효소 증가, 드물게 황달을 동반하거나 동반하지
않는 간염, 매우 드물게 간부전, 기존 간질환이 있는 환자에서 뇌병증
 - 피부 및 피하조직 : 때때로 피부염, 가려움, 발진, 두드러기, 드물게
탈모, 광각수증, 매우 드물게 다형홍반, 피부점막만증후군(스티븐스-
존슨증후군), 독성피부괴사증(리델증후군)
 - 근골격계 : 골절, 드물게 관절염, 근육통, 매우 드물게 근육쇠약
 - 신장 및 비뇨기계 : 매우 드물게 간질신장염
 - 생식계 : 매우 드물게 여성형유방
 - 전신 및 투여부위 : 드물게 무력증, 발한증가
 - 감염 : 클로스트리움 디피테리증 설사(빈도불명)
- 2) 이외에 다음의 이상반응이 1% 이상의 발생률로 이 약과 관련이 있거
나 또는 관련 가능성이 있는 것으로 보고되었다.
 - 전신 : 복부팽만, 알레르기 반응, 등통, 흉통, 흉골하흉통, 안면부종,
안면홍조, 피로, 발열, 인플루엔자 유사증상, 일반부종, 다리부종, 권태,
통증, 경직, 무력증, 말초부종
 - 심혈관계 : 흉조, 고혈압, 빈맥
 - 내분비계 : 갑상샘증
 - 소화기계 : 대장과민증, 변비약화, 소화불량, 연하곤란, 위장관형성장애
아, 상복부통증, 트림, 식도장애, 잦은อา변, 위궤양, 위장관출혈, 딸꾹
질, 흑색변, 구강장애, 인두장애, 직장장애, 위장관 증상, 혈중가스트
린증가, 하장예, 허부종, 궤양성 구내염, 구토
 - 청각 : 귀울림, 이명
 - 혈액계 : 빈혈, 저색소빈혈, 자궁경부암결핵증, 코피, 백혈구증가증,
백혈구감소증, 혈소판감소증
 - 간 : 빌리루빈혈증, 간기능 이상, ALT 증가, AST 증가
 - 대사/영양 : 당뇨, 고요산혈증, 저나트륨혈증, ALP증가, 구갈, 비타민
B₁₂결핍, 체중증가, 체중감소
 - 근골격계 : 관절염약화, 관절염증, 경련, 섬유근육통증후군, 탈장, 류
마티스증, 다발성근육통, 관절통
 - 정신신경계 : 식욕부진, 무감동, 식욕증가, 혼란, 우울약화, 과다근육
긴장증, 초조, 각각저하, 발기부전, 불면증, 편두통, 편두통약화, 수면
장애, 떨림, 어지럼(dizziness, vertigo), 시야결실, 지각이상, 졸음
 - 생식계 : 월경통, 월경장애, 질염
 - 호흡기계 : 천식약화, 기침, 호흡곤란, 후두부종, 인두염, 비염, 부비동염
 - 피부/부속기관 : 여드름, 항문가려움, 발진, 홍반발진, 반구진성발진,
혈관부종, 피부염, 가려움, 두드러기, 발한증가
 - 특수감각 : 중이염, 이상후각, 미각소실, 미각도착
 - 비뇨기계 : 소변이상, 알부민뇨, 방광염, 배뇨곤란, 진균감염, 혈뇨, 배
뇨회수, 칸디다증, 생식기칸디다증, 다뇨

- 시각 : 결막염, 시각이상
- 내시경 상에서 발견된 이상반응 : 십이지장염, 식도염, 식도협착, 식도암, 식도정맥류, 위궤양, 위염, 양성폴립 또는 결절, 비레트식도 (Barrett's esophagus), 점막변색, 탈장

3. 일반적 주의

- 1) 이 약으로 인해 악성종양의 증상이 완화되거나 진단이 지연될 수 있으므로 악성 종양에 의심되는 경우 종상·임도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토혈, 흑색변 등이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 악성이 아님을 확인하고 투여해야 한다.
- 2) 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상) 현재는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
- 3) 이 약을 필요시 투여하는 환자에게는 증상의 변화가 있을 때 의사와 상담하도록 주의시킨다. 이 약을 필요시 투여하도록 처방받은 경우 이 약의 혈중농도 변동으로 인한 다른 약물과의 상호작용을 고려해야 한다.
- 4) 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법으로 이 약과 같이 투여하는 항균제의 사용설명서를 참조해야 한다. 클라리트로마이신은 강력한 CYP3A4 억제제이므로 시사프리드와 같이 CYP3A4에 의해 대사되는 다른 약물을 복용하고 있는 환자에게 박멸요법을 실시할 경우에는 클라리트로마이신의 금기 및 상호작용을 고려해야 한다.
- 5) 프로톤펌프억제제로 인해 위내 산도가 감소하면 위장관에 보통 존재하는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리듐 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관의 감염 위험이 약간 증가할 수 있다. 이것은 클로스트리듐 디피실레균성 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 설사증세가 개선되지 않았을 때 고려되어야 한다. 클로스트리듐 디피실레균성 설사는 거의 모든 항균제 사용 중 보고되고 있다.
- 6) 일부 해의 역학연구에서 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료와 기관질, 소목 및 척추 골절의 위험성 증가와 관련이 있는 가능성이 있다고 보고되었다. 골절의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었다. 오메프라졸 및 에소오메프라졸과 골다공증성 골절 간의 연관관계가 밝혀진 것은 아니나, 골다공증 및 골다공증성 골절이 진행될 위험이 있는 환자의 경우 최신의 임상 지침에 따라 적절한 임상적 모니터링이 권고된다.
- 7) 이 약은 배당당 함유한다. 과당 불내성, 포도당-갈락토스 흡수불량 또는 수크랄제-이소말타제결핍과 같은 드문 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용해서는 안된다.
- 8) 3개월 이상 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에게서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료를 받은 경우에 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자들에게서 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로톤펌프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 다국산 또는 저마그네슘혈증을 유발하는 약물(예, 이노제)을 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주기에 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 감지, 부정맥, 발작을 포함한다.
- 9) 실험실적 검사와의 간섭 : 증가된 CgA(serum chromogranin A) 수치는 신경 내분비 종양 검사시에 간섭을 일으킬 수 있다. 이 간섭을 피하기 위해 CgA 측정하기 적어도 5일 전 일시적으로 에소오메프라졸 투여를 중지해야 한다.
- 10) 메토트렉세이트 : 프로톤펌프 억제제와 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 '사용상의 주의사항', 참조)를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토트렉세이트를 사용하는 경우, 프로톤펌프 억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다(4. 상호작용항 참조).
- 11) 치료시 경과를 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량 및 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다.

4. 상호작용

- 1) 이 약 투여 중 위내 산도 감소로 인해 위 산도에 의해 흡수 기전이 영향을 받는 약물의 흡수가 증가 또는 감소될 수 있다. 다른 산 분비 억제제나 제산제와 마찬가지로 이 약 투여 중에는 케토나졸과 이트라코나졸 및 엘로티나이드의 흡수가 감소될 수 있고 디곡신의 흡수가 증가할 수 있다. 건강한 지원자들에서 오메프라졸(하루에 20mg)과 디곡신의 동시투여는 디곡신의 생체이용률을 10%정도 증가시켰다(10명의 지원자 중 2명은 30%까지 증가). 이 약은 오메프라졸의 이상질제이다. 따라서 이 약을 디곡산과 병용투여시 환자의 상태는 모니터링 되어야 한다.
- 2) 이 약은 CYP2C19와 CYP3A4에 의해 대사된다. 그리고 이 약은 이 약의 주 대사효소인 CYP2C19를 저해한다. 디아제팜, 시탈로프람, 이미프라민, 클로미프라민, 페니토인, 와르파린 등과 같이 CYP2C19에 의해 대사되는 약물과 병용시 이들 약물의 혈장 농도가 증가될 수 있으므로 이들 약물의 강량이 필요할 수 있다. CYP2C19 기질인 디아제팜과 이 약 30mg의 병용투여로 디아제팜의 청소율이 45% 감소되었다. 간질환자에게 페니토인과 이 약 40mg의 병용투여로 페니토인의 혈장농도 최저치가 13% 증가되었다. 이 약을 투여하기 시작하거나 중단할 때 페니토인의 혈장 농도를 모니터링하도록 한다. 오메프라졸(1일 1회 40mg 투여)은 보리코나졸(CYP2C19 기질)의 C_{max}와 AUC₀₋₂₄를 각각 15% 및 41% 증가시켰다. 임상시험에서 와르파린을 투여하고 있는 환자에게 이 약 40mg을 병용 투여하였을 때 응고 시간은 정상 범위에 포함되었다. 그러나 시판 후 조사에서 두 약물을 병용투여하는 동안 임상적으로 유의한 INR과 프로트롬빈 시간의 상승이 몇 건 보고되었으며 이는 비정상적출혈과 심지어 사망까지 초래할 수 있다. 그러므로 와르파린 또는 다른 쿠마린 유도제와 이 약과의 병용투여를 시작하거나 중단할 때 모니터링이 필요하다.
- 3) 이 약은 CYP2C19와 CYP3A4에 의해 대사된다. 이 약과 CYP3A4 저해제인 클라리트로마이신(500mg 1일 2회 투여)을 동시에 투여하면 이 약의 AUC가 2배로 증가된다. 이 약과 CYP2C19, CYP3A4 저해제의 병용투여는 이 약의 노출을 두 배 이상 증가시킬 수 있다. CYP2C19, CYP3A4 억제제인 보리코나졸은 오메프라졸의 AUC₀₋₂₄를 280%까지 증가시켰다. 이 때문에 이 약의 용량을 조절할 필요가 없다. 그러나, 중증의 간기능 장애환자의 장기간의 치료가 필요한 환자에게서는 용량조절을 고려하여야 한다.
- 4) CYP2C19나 CYP3A4 혹은 두가지 모두(예를, 리팜피산과 세인트존스 워트) 유도한다고 알려진 약물들은 에소오메프라졸 대사를 증가시킬 것으로 에소오메프라졸 혈청 농도를 감소시킬 수도 있다. 이 약과 리팜피산 또는 세인트존스워트의 병용투여를 피한다.
- 5) 이 약 뿐만 아니라, 오메프라졸도 CYP2C19의 억제제로서 작용한다. 교차연구에서 건강한 지원자에게 40mg의 오메프라졸을 투여한 경우 실로스타졸의 C_{max}와 AUC가 각각 18%와 26% 증가하였고 실로스타졸의 활성 대사체 중 하나의 C_{max}와 AUC는 각각 29%와 69% 증가하였다.
- 6) 건강한 지원자에게 오메프라졸(40mg 1일 1회 투여)과 아타자나비르 300mg/리토나비르 100mg을 병용투여했을 때 아타자나비르의 노출이 감소했다(AUC, C_{max}, C_{min}이 약 75% 감소). 아타자나비르 400mg

1일 4회 투여는 오메프라졸의 아타자나비르 노출에 대한 영향을 상쇄시킬 수 없다. 이 약을 포함한 프로톤펌프억제제들은 아타자나비르와 병용투여할 수 없다.

- 7) 오메프라졸은 몇 개의 항 바이러스제와 상호작용이 있는 것으로 보고되었다. 이 보고된 상호작용 및 임상적 중요성과 기전은 밝혀지지 않았다. 오메프라졸 투여시의 위내 산도 감소는 항 바이러스제들의 흡수를 변화시킬 수 있다. 가능한 상호작용의 또 다른 기전은 CYP2C19이며, 아타자나비르 및 넬비나비르와 같은 항바이러스 제제에서는 오메프라졸과 병용 투여시 혈청수치 감소가 보고되었으며 병용투여는 권장되지 않는다. 그 외 사퀴나비르와 같은 항바이러스 제제에서는 혈청수치 증가가 보고되었다. 오메프라졸과 병용 투여시 혈청수치가 변하지 않는 항바이러스 제제 또한 존재한다. 오메프라졸과 에소오메프라졸은 유사한 약력학/약동학적 특성을 갖고 있으므로 아타자나비르 및 넬비나비르와 같은 항바이러스제제 약물과 병용투여해서는 안된다.
- 8) 건강한 지원자에게 시사프리드와 이 약 40mg을 병용투여했을 때 시사프리드의 AUC가 32% 증가되고 배설 반감기가 31% 연장되었으나, 최고 혈장 농도의 유일한 증가는 없었다. 이러한 상호작용으로 심정 전 기생리에 대한 시사프리드의 영향이 변경되지 않았다. 즉, 시사프리드 단독 투여에 의한 QTc 간격의 감소한 연장 외에 이 약과 시사프리드의 병용투여에 의해 다른 이상 QTc 간격이 연장되지는 않았다.
- 9) 이 약은 아목시실린 또는 퀴나딘의 약물동력학에 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다.
- 10) 이 약과 나프록센 또는 로페카시브의 병용 투여를 단기간 평가한 시험에 의하면 임상적으로 연관있는 약동학적 상호작용이 나타나지 않았다.
- 11) 건강한 지원자로부터의 연구 결과로부터 클로피도그렐(조기용량 300mg/ 유지용량 1일 75mg)과 에소오메프라졸(경구투여 1일 40mg)은 약동학/약력학적인 상호작용이 있는 것으로 보여졌으며, 이것은 평균 14% 정도 혈소판 응집을 감소시키는 것으로 보여졌으며, 클로피도그렐의 활성 대사체의 노출을 평균 40% 정도 감소시키는 것으로 나타났다. 이 결과에 근거하여 에소오메프라졸과 클로피도그렐은 병용투여하지 않도록 한다.
- 12) 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토트렉세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토트렉세이트의 '사용상의 주의사항', 참조)와 프로톤펌프 억제제를 병용하는 경우 메토트렉세이트 그리고/또는 그 대사체인 히드로시메토트렉세이트의 혈청 농도가 상승 및 유지되어 메토트렉세이트의 독성이 나타날 수 있다고 보고되었다. 그러나 고용량의 메토트렉세이트와 프로톤펌프 억제제에 대한 정식 약물상호작용연구는 수행되지 않았다(3. 일반적 주의항 참조).
- 13) 이 약과 타크로리무스를 병용하면 타크로리무스의 혈청치가 증가할 수 있다.
- 14) 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법 : 클라리트로마이신 및/ 또는 에리트로마이신에 피모지돈과 병용 투여시 심부정맥(QT연장, 심실성 빈맥, 심실세동, Torsades de pointes 포함)이 나타나고 이는 클라리트로마이신 및 에리트로마이신에 의해 이들 약물의 간대사가 방해받을 것이기 때문인 것으로 외국 의약품 시판후 조사결과 보고되었으며 치명적인 사례도 보고되었다.

5. 일반적 주의

이 약의 임상 중 노출에 대한 데이터는 제한되어 있다. 동물실험 결과 배/태지 발달과 관련하여 적·간접의 유해작용은 나타나지 않았다. 라세미체 혼합물의 동물실험 결과 임상, 분만 또는 분만후 발달에 대한 적·간접의 유해작용도 나타나지 않았다. 그러나 이 약을 임부에 처방시 주의해야 한다.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 사람의 모유 중으로 이행하는지 여부는 알려져 있지 않다. 수유부를 대상으로 한 시험은 실시되지 않았으므로, 이 약을 수유 중 투여해서는 안된다.

7. 과량 투여시의 처치

계획된 과량투여(240mg/day 용량의 제한된 경험)와 관련해서 나타나는 증상은 일시적이다. 이 약 80mg을 1회 투여한 경우 별다른 문제가 없었다. 특이적인 해독제는 알려져 있지 않다. 이 약은 단백결합률이 아주 높기 때문에 투석되지 않는다. 따라서 과량투여시 대증요법 및 일반 유지요법을 사용하여야 한다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 28캡슐

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변태 또는 오손된 제품이 있으면서 사용하지 마시고, 구입한 약약이나 담당영업소에서 교환하시기 바랍니다.
※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.
※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(drugsafe.or.kr)→의약품유해사례보고에 알리시기 바랍니다.
※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
※ 이 약은 의약 또는 치료의사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문의약품입니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
이 첨부서 개장일(13년 12월)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr 나 02-576-6121, 3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 약품 정보는 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

※ 이 약을 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 복용할 때 개봉하십시오

제조원 : (주)씨티씨바이오

공장 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 38

제조외·판매처 : 경동제약(주)

공장 : 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자 상담실 전화번호 : (02)576-6121,3



경동제약주식회사

• 작성년월 : 2010. 03
• 개정년월 : 2013. 12
개정번호 : 1312J