



알부민 · 로알제리 함유 고단위 종합영양제

알부골드연질캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

로알제리(KPC)	20mg
(10-히드록시-2-데케노인산으로서 0.8mg)	
· 기원동물:벌 · 사용부위:분비물	
토코페롤아세테이트(KP)	35mg
(비타민E로서 35IU)	
아스코르브산(KP)	50mg
티아민염산염(KP)	10mg
리보플라빈(KP)	2mg
피리독신염산염(KP)	5mg
시아노코발라민(KP)	12μg
니코틴산아미드(KP)	10mg

첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색203호, 황색5호

첨가제(동물유래): 건조난백분말: 닭(난백(달걀흰자)), 젤라틴: 소(가죽)

[성상]

황갈색의 내용물이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 B1, E의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(오통, 건통(어깨결림,어깨통증) 등)
 - 각기, 눈의 피로

[용법·용량]

성인 및 8세이상 어린이: 1일 3회, 1회 1캡슐씩 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 만 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 과산화노증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 4) 임부, 수유부

5) 고지단백혈증, 당뇨병고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자.

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 설사, 묽은변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia ; 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용하십시오.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검 할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 레보도파 함유 약물과 병용(함께복용(사용))투여하지 않습니다.

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장시의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오 · 남용(잘못사용 · 남용)을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 100캡슐, 200캡슐

*본 의약품은 KGMP에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

*제품설명서 작성일자 : 2011년 04월 01일

*제품에 관한 문의는 전화(02-561-4011)로 하시기 바랍니다.

*의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) -> 정보마당 -> 의약품등정보를 참조하세요.

제조의뢰자: 슈셀생명과학(주)/경기도 안산시 단원구 목내동 448-2

제조사: (주)동구제약/경기도 화성시 향남면 상신리 901-3

판매자: (주)대웅생명과학/서울시 강동구 성내1동 469-6

