

항산화 성분이 보강된 고함량기능성비타민 임팩타민프리미엄

임팩타민프리미엄은 고함량 필수 비타민 B 8종에 항산화성분(비타민C, E, 셀레늄, 아연)과 간기능 개선 성분(UDCA)까지 총 15가지 비타민과 미네랄 성분이 함유된 프리미엄 제품입니다.

특 장 점

1. 고함량 비타민 B 8종에 항산화성분(비타민C, E, 셀레늄, 아연)과 UDCA 함유
2. 활성형인 벤토피아민(Bi) 함유로 생체내 이용률 8배 우수
3. 新기술(Opadry®EZ)코팅으로 목넘김 개선하여 복용 편리
4. 타르색소 無첨가

※ Opadry® EZ는 BPSI Holdings 유한책임회사의 상표입니다

효능·효과



피로
일이 부족 많아져
자도 자도 피로하신 분



구내염
바쁜 스케줄에 입 주위가 험고
입벌이 자주 재발하시는 분



어깨통증
목, 어깨가 뭉치고
걸리시는 분



눈의피로
컴퓨터에 스마트폰까지
눈이 침침하고 피로하신 분

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

- 유효성분
- | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 벤토피아민(비타민B ₁)(KP)..... 50mg | 클린타르타르산염(DAB)..... 50mg | (아스코르브산으로서 30mg) |
| (티아민염산염으로서 36.15mg) | 이노시톨(KP)..... 50mg | 도코페롤아세이트50%(비타민E)(EP) ...20mg |
| 리보플라빈(비타민B ₂)(KP)..... 50mg | 비오틴(USP)..... 0.25mg | (비타민B ₁₂ 로서 10 I.U.) |
| 니코틴아미드(비타민B ₃)(KP)..... 50mg | 폴산(엽산)(KP)..... 0.20mg | 셀레늄함유건조 효모(KP)..... 25mg |
| 판토텐산칼슘(비타민B ₅)(KP)..... 50mg | 산화아연(아연)(KP)..... 18.7mg | (셀레늄으로서 25μg) |
| 피리독신염산염(비타민B ₆)(KP)..... 50mg | (아연으로서 15mg) | 우르소데옥시콜산(UDCA)(JP).....15mg |
| 사이코발라민1000배산(비타민B ₁₂)(KP) .. 50mg | 아스코르브산과립97%(비타민C)(별규) .. 30.93mg | |
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 레몬향, 리보플라빈, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 AMB2 화이트 88A180040, 오파드라이 EZ 클리어 253U190007, 크로스카르멜로오스나트륨, 크로스포빈, 탭실드 흰색 93W145, 프로솔브, 히드록시프로필셀룰로오스

효능·효과

1. 다음 경우의 비타민(E, B₁, B₂, B₆, C)의 보급

- 1) 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, 노년기
- 2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염 (입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염 (혀염), 습진, 피부염
 - 각기, 눈의 피로

2. 아연의 보급

용법·용량 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회 1~2정 식후 복용하십시오.

- ※ 비타민B군의 함량이 높아 빈 속에 복용 시 일시적으로 속쓰림, 미식거림 등이 있을 수 있으니 식사 후 바로 복용하세요.
- ※ 타르색소를 첨가하지 않고 비타민B₂로 색을 구현했습니다. 보관 기간에 따라 빛, 수분, 공기 등에 의해 색상이 열어질 수 있으나, 제품 품질에 전혀 영향이 없는 자연스러운 현상이니 안심하세요.

성 상 연한 노란색의 타원형 필름코팅정제



사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자분
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 철염염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자분
 - 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자분
 - 6) 심장·순환기계기능 장애 환자분
 - 7) 신장장애 환자분
 - 8) 저단백혈증 환자분
 - 9) 통풍환자 또는 신장결석에 있는 환자분
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 피부염, 딸·호흡시 악취, 탈모, 조골증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자분이 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가할 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자분에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 항알도스테로이드, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감사치에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 췌 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

포장단위 60정/병, 150정/병

※ 복용 후 후정을 꼭 남아주세요! (비타민은 온도/습도/열 등에 약하므로 서늘하고 건조한 곳에 보관해주세요)

사용기간 제조일로부터 24개월

- ※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입한 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질변패되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(14-3330 / 1644-6223)

제조사 : (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14



대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

작성 연월일 : 2011. 04. 21
최종 개정 연월일 : 2021. 05. 20

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.